

量子场论

第 5 章 量子旋量场

5.4 节和 5.5 节

余钊焕

中山大学物理学院

<https://yzhxxzxy.github.io>




更新日期：2024 年 3 月 3 日

5.4 节 Dirac 旋量场的平面波展开

5.4.1 小节 平面波解的一般形式

 本小节讨论与表象选取无关的平面波解一般形式

 自由 Dirac 旋量场 $\psi_a(x)$ 满足 Klein-Gordon 方程 $(\partial^2 + m^2)\psi(x) = 0$

 因而在无界空间中具有平面波解

 对于确定的动量 \mathbf{k} ，假设 Dirac 方程具有如下形式的平面波解：

$$\varphi_a(x, \mathbf{k}) = w_a(k^0, \mathbf{k})e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$$


 系数 $w_a(k^0, \mathbf{k})$ 是 Dirac 旋量，带着一个旋量指标 a

5.4 节 Dirac 旋量场的平面波展开

5.4.1 小节 平面波解的一般形式

 本小节讨论与表象选取无关的平面波解一般形式


 **自由 Dirac 旋量场** $\psi_a(x)$ 满足 **Klein-Gordon 方程** $(\partial^2 + m^2)\psi(x) = 0$

 因而在无界空间中具有**平面波解**

 对于确定的动量 \mathbf{k} ，假设 **Dirac 方程**具有如下形式的**平面波解**：

$$\varphi_a(x, \mathbf{k}) = w_a(k^0, \mathbf{k})e^{-ik \cdot x}$$

 系数 $w_a(k^0, \mathbf{k})$ 是 **Dirac 旋量**，带着一个**旋量指标** a

 隐去旋量指标，将这个平面波解代入到 **Dirac 方程** $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0$ 中，得


$$0 = (i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\varphi(x, \mathbf{k}) = (\gamma^\mu k_\mu - m)w(k^0, \mathbf{k})e^{-ik \cdot x} = (k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m)w(k^0, \mathbf{k})e^{-ik \cdot x}$$

 因此

$$(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m)w(k^0, \mathbf{k}) = 0$$

本征方程

 $(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m)w(k^0, \mathbf{k}) = 0$ 左乘 γ^0 得 $[k^0 - \gamma^0(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) - m\gamma^0]w(k^0, \mathbf{k}) = 0$

 移项, 推出

$$[\gamma^0(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) + m\gamma^0]w(k^0, \mathbf{k}) = k^0 w(k^0, \mathbf{k})$$

 这是矩阵 $\gamma^0(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) + m\gamma^0$ 的本征方程


 它具有非平庸解的条件是特征多项式 $\det[k^0 - \gamma^0(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) - m\gamma^0]$ 为零, 即

$$\det[k^0 - \gamma^0(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) - m\gamma^0] = 0$$

 这个方程的根给出 k^0 的本征值, 相应的非平庸解是本征矢量

本征方程

 $(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m)w(k^0, \mathbf{k}) = 0$ 左乘 γ^0 得 $[k^0 - \gamma^0(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) - m\gamma^0]w(k^0, \mathbf{k}) = 0$

 移项, 推出


$$[\gamma^0(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) + m\gamma^0]w(k^0, \mathbf{k}) = k^0 w(k^0, \mathbf{k})$$

 这是矩阵 $\gamma^0(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) + m\gamma^0$ 的本征方程


 它具有非平庸解的条件是特征多项式 $\det[k^0 - \gamma^0(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) - m\gamma^0]$ 为零, 即

$$\det[k^0 - \gamma^0(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) - m\gamma^0] = 0$$

 这个方程的根给出 k^0 的本征值, 相应的非平庸解是本征矢量

 利用 $(\gamma^0)^2 = 1$, 将这个方程化为

$$\begin{aligned} 0 &= \det[k^0 \mathbf{1} - \gamma^0(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) - m\gamma^0] = \det[\gamma^0(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m)] \\ &= \det(\gamma^0) \det(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m) \end{aligned}$$

 因而它等价于

$$\det(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m) = 0$$

$$[\det(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m)]^2$$

🔗 利用 $(\gamma^5)^2 = \mathbf{1}$ ，将方程 $\det(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m) = 0$ 左边化为

$$\begin{aligned} \det(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m) &= \det[(\gamma^5)^2 (k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m)] = \det[\gamma^5 (k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m) \gamma^5] \\ &= \det[(\gamma^5)^2 (-k^0 \gamma^0 + \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m)] = \det[-(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) - m] \end{aligned}$$

🔗 这里第二步用到行列式性质 $\det(AB) = \det(BA)$ ，第三步用到 $\gamma^\mu \gamma^5 = -\gamma^5 \gamma^\mu$

$$[\det(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m)]^2$$

🔗 利用 $(\gamma^5)^2 = \mathbf{1}$ ，将方程 $\det(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m) = 0$ 左边化为

$$\begin{aligned} \det(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m) &= \det[(\gamma^5)^2 (k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m)] = \det[\gamma^5 (k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m) \gamma^5] \\ &= \det[(\gamma^5)^2 (-k^0 \gamma^0 + \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m)] = \det[-(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) - m] \end{aligned}$$

🔗 这里第二步用到行列式性质 $\det(AB) = \det(BA)$ ，第三步用到 $\gamma^\mu \gamma^5 = -\gamma^5 \gamma^\mu$

🔗 利用

$$\begin{aligned} (k_\mu \gamma^\mu)^2 &= k_\mu k_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu = \frac{1}{2} k_\mu k_\nu (\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu) \\ &= k_\mu k_\nu g^{\mu\nu} \mathbf{1} = k^2 \mathbf{1} = [(k^0)^2 - |\mathbf{k}|^2] \mathbf{1} \end{aligned}$$

🔗 推出

$$\begin{aligned} &[\det(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m)]^2 \\ &= \det[(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) - m] \det[-(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) - m] \\ &= \det(k_\mu \gamma^\mu - m) \det(-k_\nu \gamma^\nu - m) = \det[(k_\mu \gamma^\mu - m)(-k_\nu \gamma^\nu - m)] \\ &= \det[-(k_\mu \gamma^\mu)^2 + m^2] = \det\{[-(k^0)^2 + |\mathbf{k}|^2 + m^2] \mathbf{1}\} \\ &= [-(k^0)^2 + |\mathbf{k}|^2 + m^2]^4 = [E_{\mathbf{k}}^2 - (k^0)^2]^4 \end{aligned}$$

🔗 其中 $E_{\mathbf{k}} \equiv \sqrt{|\mathbf{k}|^2 + m^2}$

本征矢量

🚲 $[\det(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m)]^2 = [E_{\mathbf{k}}^2 - (k^0)^2]^4$ 表明

$$\det(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m) = [E_{\mathbf{k}}^2 - (k^0)^2]^2 = (E_{\mathbf{k}} + k^0)^2 (E_{\mathbf{k}} - k^0)^2$$

🌀 因此方程 $\det(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m) = 0$ 有 2 个根 $k^0 = \pm E_{\mathbf{k}}$

👉 这 2 个根都是 2 重根，各自对应于 2 个线性独立的本征矢量

🏹 它们是本征方程 $[\gamma^0(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) + m\gamma^0]w(k^0, \mathbf{k}) = k^0 w(k^0, \mathbf{k})$ 的解

本征矢量

🚲 $[\det(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m)]^2 = [E_{\mathbf{k}}^2 - (k^0)^2]^4$ 表明

$$\det(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m) = [E_{\mathbf{k}}^2 - (k^0)^2]^2 = (E_{\mathbf{k}} + k^0)^2 (E_{\mathbf{k}} - k^0)^2$$

🌀 因此方程 $\det(k^0 \gamma^0 - \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma} - m) = 0$ 有 **2 个根** $k^0 = \pm E_{\mathbf{k}}$

🔪 这 2 个根都是 **2 重根**，各自对应于 **2 个线性独立的本征矢量**

🏹 它们是本征方程 $[\gamma^0(\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\gamma}) + m\gamma^0]w(k^0, \mathbf{k}) = k^0 w(k^0, \mathbf{k})$ 的解

① $k^0 = E_{\mathbf{k}}$ 对应于 **2 个本征矢量** $w^{(+)}(E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma)$, $\sigma = 1, 2$

👉 因而 $e^{-ik \cdot x} = \exp[-i(E_{\mathbf{k}}t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})]$ ，平面波解中有 **2 个正能解**，形式为

$$w^{(+)}(E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma) \exp[-i(E_{\mathbf{k}}t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})], \quad \sigma = 1, 2$$

② $k^0 = -E_{\mathbf{k}}$ 对应于 **2 个本征矢量** $w^{(-)}(-E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma)$, $\sigma = 1, 2$

👉 因而 $e^{-ik \cdot x} = \exp[-i(-E_{\mathbf{k}}t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})]$ ，平面波解中有 **2 个负能解**，形式为

$$w^{(-)}(-E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma) \exp[i(E_{\mathbf{k}}t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})], \quad \sigma = 1, 2$$

正能解和负能解

 将这 4 个本征矢量的正交归一关系取为

$$w^{(+)\dagger}(E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma) w^{(+)}(E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma') = 2E_{\mathbf{k}} \delta_{\sigma\sigma'}$$

$$w^{(-)\dagger}(-E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma) w^{(-)}(-E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma') = 2E_{\mathbf{k}} \delta_{\sigma\sigma'}$$

$$w^{(+)\dagger}(E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma) w^{(-)}(-E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma') = w^{(-)\dagger}(-E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma) w^{(+)}(E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma') = 0$$


正能解和负能解

 将这 4 个本征矢量的正交归一关系取为

$$w^{(+)\dagger}(E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma) w^{(+)}(E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma') = 2E_{\mathbf{k}} \delta_{\sigma\sigma'}$$

$$w^{(-)\dagger}(-E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma) w^{(-)}(-E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma') = 2E_{\mathbf{k}} \delta_{\sigma\sigma'}$$

$$w^{(+)\dagger}(E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma) w^{(-)}(-E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma') = w^{(-)\dagger}(-E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma) w^{(+)}(E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma') = 0$$


 引入 Dirac 旋量 $u(\mathbf{k}, \sigma)$ 和 $v(\mathbf{k}, \sigma)$ ，定义为

$$u(\mathbf{k}, \sigma) \equiv w^{(+)}(E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma), \quad v(\mathbf{k}, \sigma) \equiv w^{(-)}(-E_{\mathbf{k}}, -\mathbf{k}, \sigma), \quad \sigma = 1, 2$$

 于是，Dirac 方程的正能解和负能解可以分别写作

$$\varphi^{(+)}(x, \mathbf{k}, \sigma) \equiv w^{(+)}(E_{\mathbf{k}}, \mathbf{k}, \sigma) \exp[-i(E_{\mathbf{k}}t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})] = u(\mathbf{k}, \sigma) \exp[-i(E_{\mathbf{k}}t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})]$$

$$\varphi^{(-)}(x, \mathbf{k}, \sigma) \equiv w^{(-)}(-E_{\mathbf{k}}, -\mathbf{k}, \sigma) \exp[i(E_{\mathbf{k}}t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})] = v(\mathbf{k}, \sigma) \exp[i(E_{\mathbf{k}}t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})]$$

 替换动量记号，得到 $\varphi^{(+)}(x, \mathbf{p}, \sigma) = u(\mathbf{p}, \sigma)e^{-ip \cdot x}$ 和 $\varphi^{(-)}(x, \mathbf{p}, \sigma) = v(\mathbf{p}, \sigma)e^{ip \cdot x}$

 其中 $p^0 = E_{\mathbf{p}} \equiv \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2} > 0$

平面波展开

🚲 从而，Dirac 旋量场算符 $\psi(\mathbf{x}, t)$ 的平面波展开式可写作

$$\begin{aligned}\psi(\mathbf{x}, t) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma=1}^2 \left[\varphi^{(+)}(\mathbf{x}, \mathbf{p}, \sigma) c_{\mathbf{p}, \sigma} + \varphi^{(-)}(\mathbf{x}, \mathbf{p}, \sigma) d_{\mathbf{p}, \sigma}^{\dagger} \right] \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\sigma=1}^2 \left[u(\mathbf{p}, \sigma) c_{\mathbf{p}, \sigma} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + v(\mathbf{p}, \sigma) d_{\mathbf{p}, \sigma}^{\dagger} e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \right]\end{aligned}$$

👤 其中， $c_{\mathbf{p}, \sigma}$ 是湮灭算符， $d_{\mathbf{p}, \sigma}^{\dagger}$ 是产生算符，而且 $c_{\mathbf{p}, \sigma} \neq d_{\mathbf{p}, \sigma}$


👤 平面波旋量系数 $u(\mathbf{p}, \sigma)$ 和 $v(\mathbf{p}, \sigma)$ 的正交归一关系为


$$u^{\dagger}(\mathbf{p}, \sigma) u(\mathbf{p}, \sigma') = w^{(+)\dagger}(E_{\mathbf{p}}, \mathbf{p}, \sigma) w^{(+)}(E_{\mathbf{p}}, \mathbf{p}, \sigma') = 2E_{\mathbf{p}} \delta_{\sigma\sigma'}$$

$$v^{\dagger}(\mathbf{p}, \sigma) v(\mathbf{p}, \sigma') = w^{(-)\dagger}(-E_{\mathbf{p}}, -\mathbf{p}, \sigma) w^{(-)}(-E_{\mathbf{p}}, -\mathbf{p}, \sigma') = 2E_{\mathbf{p}} \delta_{\sigma\sigma'}$$

$$u^{\dagger}(\mathbf{p}, \sigma) v(-\mathbf{p}, \sigma') = w^{(+)\dagger}(E_{\mathbf{p}}, \mathbf{p}, \sigma) w^{(-)}(-E_{\mathbf{p}}, \mathbf{p}, \sigma') = 0$$

5.4.2 小节 Weyl 表象中的平面波解


 本小节在 Weyl 表象中讨论 Dirac 方程的平面波解


 Dirac 旋量场描述自旋为 $1/2$ 的有质量粒子，根据 3.3.1 小节讨论，这样的粒子具有 2 种独立的自旋极化态，对应于螺旋度的 2 种本征值 $+1/2$ 和 $-1/2$

 1 为便于表述，这里采用归一化的螺旋度本征值 $\lambda = \pm$

 2 类似于矢量场情况， $\lambda = -$ 是左旋极化， $\lambda = +$ 是右旋极化


5.4.2 小节 Weyl 表象中的平面波解


 本小节在 **Weyl 表象** 中讨论 **Dirac 方程** 的平面波解

 **Dirac 旋量场** 描述自旋为 $1/2$ 的有质量粒子，根据 3.3.1 小节讨论，这样的粒子具有 **2 种独立的自旋极化态**，对应于螺旋度的 2 种本征值 $+1/2$ 和 $-1/2$

 为便于表述，这里采用归一化的螺旋度本征值 $\lambda = \pm$

 类似于矢量场情况， $\lambda = -$ 是左旋极化， $\lambda = +$ 是右旋极化

 因此，无论是平面波正能解还是负能解，都能够以 **2 种螺旋度本征态** 作为 **2 个线性独立的本征矢量**

 按照这个思路，把 2 个正能解表达为

$$\varphi^{(+)}(x, \mathbf{p}, \lambda) = u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-ip \cdot x}, \quad \lambda = \pm, \quad p^0 = E_{\mathbf{p}} = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2}$$

 根据 **Dirac 方程** $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0$ ，有

$$0 = (i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\varphi^{(+)}(x, \mathbf{p}, \lambda) = (p_\mu \gamma^\mu - m)u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-ip \cdot x}$$

$u(\mathbf{p}, \lambda)$ 的运动方程

🚗 $(p_\mu \gamma^\mu - m)u(\mathbf{p}, \lambda)e^{-ip \cdot x} = 0$ 表明 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 满足运动方程

$$(\not{p} - m)u(\mathbf{p}, \lambda) = 0$$

🚩 其中 \not{p} 的定义为 $\not{p} \equiv p_\mu \gamma^\mu$ ，这种记号称为 Dirac 斜线

(slash)，是 Richard Feynman 引进的



Richard Feynman
(1918–1988)

$u(\mathbf{p}, \lambda)$ 的运动方程

🚗 $(p_\mu \gamma^\mu - m)u(\mathbf{p}, \lambda)e^{-ip \cdot x} = 0$ 表明 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 满足运动方程

$$(\not{p} - m)u(\mathbf{p}, \lambda) = 0$$

🚩 其中 \not{p} 的定义为 $\not{p} \equiv p_\mu \gamma^\mu$ ，这种记号称为 Dirac 斜线

(slash)，是 Richard Feynman 引进的

🚩 将 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 分解为两个二分量旋量 $f_\lambda(\mathbf{p})$ 和 $g_\lambda(\mathbf{p})$ ，

$$u(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} f_\lambda(\mathbf{p}) \\ g_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$


⑧ 根据 Weyl 表象中的 Dirac 矩阵表达式 $\gamma^\mu = \begin{pmatrix} & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & \end{pmatrix}$ ，运动方程化为

$$0 = (\not{p} - m)u(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} -m & \sigma^\mu p_\mu \\ \bar{\sigma}^\mu p_\mu & -m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_\lambda(\mathbf{p}) \\ g_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_\mu \sigma^\mu g_\lambda(\mathbf{p}) - m f_\lambda(\mathbf{p}) \\ p_\mu \bar{\sigma}^\mu f_\lambda(\mathbf{p}) - m g_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$



Richard Feynman
(1918–1988)

$f_\lambda(\mathbf{p})$ 与 $g_\lambda(\mathbf{p})$ 的关系

 从而得到两条方程

$$(p \cdot \sigma)g_\lambda(\mathbf{p}) - mf_\lambda(\mathbf{p}) = 0, \quad (p \cdot \bar{\sigma})f_\lambda(\mathbf{p}) - mg_\lambda(\mathbf{p}) = 0$$


 由**第二条方程**得

$$g_\lambda(\mathbf{p}) = \frac{p \cdot \bar{\sigma}}{m} f_\lambda(\mathbf{p})$$

 将上式代入到**第一条方程**左边，得

$$(p \cdot \sigma)g_\lambda(\mathbf{p}) - mf_\lambda(\mathbf{p}) = \frac{(p \cdot \sigma)(p \cdot \bar{\sigma})}{m} f_\lambda(\mathbf{p}) - mf_\lambda(\mathbf{p})$$

$f_\lambda(\mathbf{p})$ 与 $g_\lambda(\mathbf{p})$ 的关系

 从而得到两条方程


$$(p \cdot \sigma)g_\lambda(\mathbf{p}) - mf_\lambda(\mathbf{p}) = 0, \quad (p \cdot \bar{\sigma})f_\lambda(\mathbf{p}) - mg_\lambda(\mathbf{p}) = 0$$

 由**第二条方程**得

$$g_\lambda(\mathbf{p}) = \frac{p \cdot \bar{\sigma}}{m} f_\lambda(\mathbf{p})$$

 将上式代入到**第一条方程**左边，得

$$(p \cdot \sigma)g_\lambda(\mathbf{p}) - mf_\lambda(\mathbf{p}) = \frac{(p \cdot \sigma)(p \cdot \bar{\sigma})}{m} f_\lambda(\mathbf{p}) - mf_\lambda(\mathbf{p})$$

 为化简 $(p \cdot \sigma)(p \cdot \bar{\sigma})$ ，由 $\gamma^\mu = \begin{pmatrix} \sigma^\mu & \\ & \bar{\sigma}^\mu \end{pmatrix}$ 得反对易关系

$$2g^{\mu\nu} \begin{pmatrix} 1 & \\ & 1 \end{pmatrix} = \{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = \begin{pmatrix} \sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu + \sigma^\nu \bar{\sigma}^\mu & \\ & \bar{\sigma}^\mu \sigma^\nu + \bar{\sigma}^\nu \sigma^\mu \end{pmatrix}$$

 因此 $\sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu + \sigma^\nu \bar{\sigma}^\mu = 2g^{\mu\nu}$ ， $\bar{\sigma}^\mu \sigma^\nu + \bar{\sigma}^\nu \sigma^\mu = 2g^{\mu\nu}$

$u(\mathbf{p}, \lambda)$ 的形式

 从而

$$\begin{aligned}
 (p \cdot \sigma)(p \cdot \bar{\sigma}) &= p_\mu p_\nu \sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu = \frac{1}{2} p_\mu p_\nu (\sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu + \sigma^\nu \bar{\sigma}^\mu) \\
 &= \frac{1}{2} p_\mu p_\nu 2g^{\mu\nu} = p^2 = m^2
 \end{aligned}$$

 故

$$\begin{aligned}
 (p \cdot \sigma)g_\lambda(\mathbf{p}) - mf_\lambda(\mathbf{p}) &= \frac{(p \cdot \sigma)(p \cdot \bar{\sigma})}{m} f_\lambda(\mathbf{p}) - mf_\lambda(\mathbf{p}) \\
 &= \frac{m^2}{m} f_\lambda(\mathbf{p}) - mf_\lambda(\mathbf{p}) = 0
 \end{aligned}$$


$u(\mathbf{p}, \lambda)$ 的形式

 从而

$$\begin{aligned}(p \cdot \sigma)(p \cdot \bar{\sigma}) &= p_\mu p_\nu \sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu = \frac{1}{2} p_\mu p_\nu (\sigma^\mu \bar{\sigma}^\nu + \sigma^\nu \bar{\sigma}^\mu) \\ &= \frac{1}{2} p_\mu p_\nu 2g^{\mu\nu} = p^2 = m^2\end{aligned}$$

 故

$$\begin{aligned}(p \cdot \sigma)g_\lambda(\mathbf{p}) - m f_\lambda(\mathbf{p}) &= \frac{(p \cdot \sigma)(p \cdot \bar{\sigma})}{m} f_\lambda(\mathbf{p}) - m f_\lambda(\mathbf{p}) \\ &= \frac{m^2}{m} f_\lambda(\mathbf{p}) - m f_\lambda(\mathbf{p}) = 0\end{aligned}$$

 可见关系式 $g_\lambda(\mathbf{p}) = \frac{p \cdot \bar{\sigma}}{m} f_\lambda(\mathbf{p})$ 也符合第一条方程


 于是，任取非零 $f_\lambda(\mathbf{p})$ 都能使


$$u(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} f_\lambda(\mathbf{p}) \\ \frac{p \cdot \bar{\sigma}}{m} f_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

满足运动方程 $(\not{p} - m)u(\mathbf{p}, \lambda) = 0$


螺旋度矩阵

 旋量表示中螺旋度矩阵是自旋角动量矩阵 S 在动量 \mathbf{p} 方向上的投影，即 $\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{S}$

 对于 Weyl 表象，由 $S^i = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sigma^i & \\ & \sigma^i \end{pmatrix}$ 得 $\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma} & \\ & \hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}$

 因而归一化螺旋度矩阵为 $2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{S} = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma} & \\ & \hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}$

 两个对角分块相同，左手和右手 Weyl 旋量对应的归一化螺旋度矩阵都是 $\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}$


 代入 Pauli 矩阵 $\sigma^1 = \begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}$ 、 $\sigma^2 = \begin{pmatrix} & -i \\ i & \end{pmatrix}$ 和 $\sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix}$ ，推出

$$\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \frac{\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{|\mathbf{p}|} = \frac{1}{|\mathbf{p}|} \begin{pmatrix} p^3 & p^1 - ip^2 \\ p^1 + ip^2 & -p^3 \end{pmatrix}$$


螺旋态

 引入归一化螺旋度矩阵 $\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 的本征矢量 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ ，称为螺旋态，满足本征方程

$$(\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) = \lambda \xi_\lambda(\mathbf{p}), \quad \lambda = \pm$$

 求解这个方程，得到归一化本征矢量

$$\xi_+(\mathbf{p}) = \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}| + p^3 \\ p^1 + ip^2 \end{pmatrix}, \quad \xi_-(\mathbf{p}) = \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \begin{pmatrix} -p^1 + ip^2 \\ |\mathbf{p}| + p^3 \end{pmatrix}$$


 满足正交归一关系 $\xi_\lambda^\dagger(\mathbf{p}) \xi_{\lambda'}(\mathbf{p}) = \delta_{\lambda\lambda'}$ 和完备性关系

$$\sum_{\lambda=\pm} \xi_\lambda(\mathbf{p}) \xi_\lambda^\dagger(\mathbf{p}) = \mathbf{1}$$


螺旋态

 引入归一化螺旋度矩阵 $\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 的本征矢量 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ ，称为螺旋态，满足本征方程


$$(\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) = \lambda \xi_\lambda(\mathbf{p}), \quad \lambda = \pm$$


 求解这个方程，得到归一化本征矢量

$$\xi_+(\mathbf{p}) = \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \begin{pmatrix} |\mathbf{p}| + p^3 \\ p^1 + ip^2 \end{pmatrix}, \quad \xi_-(\mathbf{p}) = \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|(|\mathbf{p}| + p^3)}} \begin{pmatrix} -p^1 + ip^2 \\ |\mathbf{p}| + p^3 \end{pmatrix}$$

 满足正交归一关系 $\xi_\lambda^\dagger(\mathbf{p}) \xi_{\lambda'}(\mathbf{p}) = \delta_{\lambda\lambda'}$ 和完备性关系


$$\sum_{\lambda=\pm} \xi_\lambda(\mathbf{p}) \xi_\lambda^\dagger(\mathbf{p}) = 1$$

 由 $\hat{\mathbf{p}} = \mathbf{p}/|\mathbf{p}|$ 得 $(\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) = \lambda |\mathbf{p}| \xi_\lambda(\mathbf{p})$

 根据 $\sigma^\mu = (1, \boldsymbol{\sigma})$ 和 $\bar{\sigma}^\mu = (1, -\boldsymbol{\sigma})$ ，有

$$(\mathbf{p} \cdot \bar{\boldsymbol{\sigma}}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) = (E_p \mathbf{1} + \mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) = (E_p + \lambda |\mathbf{p}|) \xi_\lambda(\mathbf{p}) = \omega_\lambda^2(\mathbf{p}) \xi_\lambda(\mathbf{p})$$


$$(\mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) = (E_p \mathbf{1} - \mathbf{p} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) = (E_p - \lambda |\mathbf{p}|) \xi_\lambda(\mathbf{p}) = \omega_{-\lambda}^2(\mathbf{p}) \xi_\lambda(\mathbf{p})$$

 其中函数 $\omega_\lambda(\mathbf{p})$ 定义为

$$\omega_\lambda(\mathbf{p}) \equiv \sqrt{E_p + \lambda |\mathbf{p}|}$$

$u(\mathbf{p}, \lambda)$ 作为螺旋度本征态


 为了让 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 作为螺旋度本征态，设 $f_\lambda(\mathbf{p})$ 正比于 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ ， $f_\lambda(\mathbf{p}) = C_{\mathbf{p}, \lambda} \xi_\lambda(\mathbf{p})$

 利用 $(\mathbf{p} \cdot \vec{\sigma})\xi_\lambda(\mathbf{p}) = \omega_\lambda^2(\mathbf{p})\xi_\lambda(\mathbf{p})$ ，推出

$$u(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} f_\lambda(\mathbf{p}) \\ \frac{\mathbf{p} \cdot \vec{\sigma}}{m} f_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = C_{\mathbf{p}, \lambda} \begin{pmatrix} \xi_\lambda(\mathbf{p}) \\ \frac{\mathbf{p} \cdot \vec{\sigma}}{m} \xi_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = C_{\mathbf{p}, \lambda} \begin{pmatrix} \xi_\lambda(\mathbf{p}) \\ \frac{\omega_\lambda^2(\mathbf{p})}{m} \xi_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

$u(\mathbf{p}, \lambda)$ 作为螺旋度本征态


 为了让 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 作为螺旋度本征态，设 $f_\lambda(\mathbf{p})$ 正比于 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ ， $f_\lambda(\mathbf{p}) = C_{\mathbf{p}, \lambda} \xi_\lambda(\mathbf{p})$

 利用 $(\mathbf{p} \cdot \vec{\sigma}) \xi_\lambda(\mathbf{p}) = \omega_\lambda^2(\mathbf{p}) \xi_\lambda(\mathbf{p})$ ，推出


$$u(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} f_\lambda(\mathbf{p}) \\ \frac{\mathbf{p} \cdot \vec{\sigma}}{m} f_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = C_{\mathbf{p}, \lambda} \begin{pmatrix} \xi_\lambda(\mathbf{p}) \\ \frac{\mathbf{p} \cdot \vec{\sigma}}{m} \xi_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = C_{\mathbf{p}, \lambda} \begin{pmatrix} \xi_\lambda(\mathbf{p}) \\ \frac{\omega_\lambda^2(\mathbf{p})}{m} \xi_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

 为了使 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 满足归一关系 $u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{p}, \lambda) = 2E_{\mathbf{p}}$ ，取

$$C_{\mathbf{p}, \lambda} = \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})$$

 注意到


$$\omega_\lambda(\mathbf{p}) \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) = \sqrt{(E_{\mathbf{p}} + \lambda|\mathbf{p}|)(E_{\mathbf{p}} - \lambda|\mathbf{p}|)} = \sqrt{E_{\mathbf{p}}^2 - \lambda^2|\mathbf{p}|^2} = \sqrt{E_{\mathbf{p}}^2 - |\mathbf{p}|^2} = m$$

 有 $C_{\mathbf{p}, \lambda} \frac{\omega_\lambda^2(\mathbf{p})}{m} = \frac{\omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) \omega_\lambda(\mathbf{p})}{m} \omega_\lambda(\mathbf{p}) = \omega_\lambda(\mathbf{p})$

$u(\mathbf{p}, \lambda)$ 的螺旋态表达式


 于是得到 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 的螺旋态表达式

$$u(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) \\ \omega_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

 根据 $2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{S} = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma} & \\ & \hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}$, $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 是螺旋度本征态, 本征值为 λ :

$$\begin{aligned} (2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{S})u(\mathbf{p}, \lambda) &= \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) (\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma})\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) \\ \omega_{\lambda}(\mathbf{p}) (\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma})\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} \\ &= \lambda \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) \\ \omega_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \lambda u(\mathbf{p}, \lambda) \end{aligned}$$

$v(\mathbf{p}, \lambda)$ 的运动方程

 另一方面，将 2 个负能解表达为

$$\varphi^{(-)}(x, \mathbf{p}, \lambda) = v(\mathbf{p}, \lambda)e^{ip \cdot x}, \quad \lambda = \pm, \quad p^0 = E_{\mathbf{p}} = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2}$$

 根据 Dirac 方程 $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0$ ，有

$$0 = (i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\varphi^{(-)}(x, \mathbf{p}, \lambda) = (-p_\mu \gamma^\mu - m)v(\mathbf{p}, \lambda)e^{ip \cdot x}$$

 即 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 满足运动方程

$$(\not{p} + m)v(\mathbf{p}, \lambda) = 0$$

$v(\mathbf{p}, \lambda)$ 的运动方程

🚗 另一方面，将 2 个负能解表达为

$$\varphi^{(-)}(x, \mathbf{p}, \lambda) = v(\mathbf{p}, \lambda)e^{ip \cdot x}, \quad \lambda = \pm, \quad p^0 = E_{\mathbf{p}} = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2}$$

🍊 根据 Dirac 方程 $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0$ ，有

$$0 = (i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\varphi^{(-)}(x, \mathbf{p}, \lambda) = (-p_\mu \gamma^\mu - m)v(\mathbf{p}, \lambda)e^{ip \cdot x}$$


🌲 即 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 满足运动方程

$$(\not{p} + m)v(\mathbf{p}, \lambda) = 0$$

👩🏫 同样将 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 分解为两个二分量旋量 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p})$ 和 $\tilde{g}_\lambda(\mathbf{p})$ ， $v(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) \\ \tilde{g}_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$ ，则

$$0 = (\not{p} + m)v(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} m & \sigma^\mu p_\mu \\ \bar{\sigma}^\mu p_\mu & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) \\ \tilde{g}_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_\mu \sigma^\mu \tilde{g}_\lambda(\mathbf{p}) + m\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) \\ p_\mu \bar{\sigma}^\mu \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) + m\tilde{g}_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$


$v(\mathbf{p}, \lambda)$ 的形式

 从而得到两个方程


$$(p \cdot \sigma) \tilde{g}_\lambda(\mathbf{p}) + m \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) = 0, \quad (p \cdot \bar{\sigma}) \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) + m \tilde{g}_\lambda(\mathbf{p}) = 0$$

 由第二条方程得

$$\tilde{g}_\lambda(\mathbf{p}) = -\frac{p \cdot \bar{\sigma}}{m} \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p})$$

 代入到第一条方程左边, 由 $(p \cdot \sigma)(p \cdot \bar{\sigma}) = m^2$ 式推出

$$(p \cdot \sigma) \tilde{g}_\lambda(\mathbf{p}) + m \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) = -\frac{(p \cdot \sigma)(p \cdot \bar{\sigma})}{m} \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) + m \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) = -\frac{m^2}{m} \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) + m \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) = 0$$


 可见, 关系式 $\tilde{g}_\lambda(\mathbf{p}) = -\frac{p \cdot \bar{\sigma}}{m} \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p})$ 符合第一条方程

 于是, 任取非零 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p})$ 都能使


$$v(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) \\ -\frac{p \cdot \bar{\sigma}}{m} \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

满足运动方程 $(\not{p} + m)v(\mathbf{p}, \lambda) = 0$

$v(\mathbf{p}, \lambda)$ 作为螺旋度本征态


 为了让 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 作为螺旋度本征态，设 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p})$ 正比于 $\xi_{-\lambda}(\mathbf{p})$ ， $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) = \tilde{C}_{\mathbf{p}, \lambda} \xi_{-\lambda}(\mathbf{p})$

 这里没有选择让 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p})$ 正比于 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ ，原因将在 5.5.4 小节中说明


 现在姑且接受这种选择，从而由 $(\mathbf{p} \cdot \vec{\sigma})\xi_\lambda(\mathbf{p}) = \omega_\lambda^2(\mathbf{p})\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 推出

$$v(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) \\ -\frac{\mathbf{p} \cdot \vec{\sigma}}{m} \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \tilde{C}_{\mathbf{p}, \lambda} \begin{pmatrix} \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\frac{(\mathbf{p} \cdot \vec{\sigma})}{m} \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \tilde{C}_{\mathbf{p}, \lambda} \begin{pmatrix} \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\frac{\omega_{-\lambda}^2(\mathbf{p})}{m} \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

$v(\mathbf{p}, \lambda)$ 作为螺旋度本征态

 为了让 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 作为螺旋度本征态，设 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p})$ 正比于 $\xi_{-\lambda}(\mathbf{p})$ ， $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) = \tilde{C}_{\mathbf{p}, \lambda} \xi_{-\lambda}(\mathbf{p})$

 这里没有选择让 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p})$ 正比于 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ ，原因将在 5.5.4 小节中说明

 现在姑且接受这种选择，从而由 $(\mathbf{p} \cdot \vec{\sigma})\xi_\lambda(\mathbf{p}) = \omega_\lambda^2(\mathbf{p})\xi_\lambda(\mathbf{p})$ 推出

$$v(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) \\ -\frac{\mathbf{p} \cdot \vec{\sigma}}{m} \tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \tilde{C}_{\mathbf{p}, \lambda} \begin{pmatrix} \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\frac{(\mathbf{p} \cdot \vec{\sigma})}{m} \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \tilde{C}_{\mathbf{p}, \lambda} \begin{pmatrix} \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\frac{\omega_{-\lambda}^2(\mathbf{p})}{m} \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

 为了使 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 满足归一关系 $v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda)v(\mathbf{p}, \lambda) = 2E_{\mathbf{p}}$ ，取

$$\tilde{C}_{\mathbf{p}, \lambda} = \lambda \omega_\lambda(\mathbf{p})$$

 由 $\omega_\lambda(\mathbf{p})\omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) = m$ 得

$$-\tilde{C}_{\mathbf{p}, \lambda} \frac{\omega_{-\lambda}^2(\mathbf{p})}{m} = -\lambda \frac{\omega_\lambda(\mathbf{p})\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})}{m} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) = -\lambda \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})$$

$v(\mathbf{p}, \lambda)$ 的螺旋态表达式

 于是得到 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 的螺旋态表达式

$$v(\mathbf{p}, \lambda) = \begin{pmatrix} \lambda \omega_{\lambda}(\mathbf{p}) \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\lambda \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$


 这样一来, $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 是螺旋度本征态, 本征值为 $-\lambda$:

$$\begin{aligned} (2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{S})v(\mathbf{p}, \lambda) &= \begin{pmatrix} \lambda \omega_{\lambda}(\mathbf{p}) (\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\lambda \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) (\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} \\ &= -\lambda \begin{pmatrix} \lambda \omega_{\lambda}(\mathbf{p}) \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\lambda \omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) \xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = -\lambda v(\mathbf{p}, \lambda) \end{aligned}$$

平面波旋量系数的关系


 可以验证，以上平面波旋量系数 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 满足正交归一关系

$$\begin{aligned} u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda)u(\mathbf{p}, \lambda') &= v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda)v(\mathbf{p}, \lambda') = 2E_{\mathbf{p}}\delta_{\lambda\lambda'} \\ u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda)v(-\mathbf{p}, \lambda') &= v^\dagger(-\mathbf{p}, \lambda)u(\mathbf{p}, \lambda') = 0 \end{aligned}$$

 记 $\bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) = u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda)\gamma^0$ ， $\bar{v}(\mathbf{p}, \lambda) = v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda)\gamma^0$ ，可以推出 Lorentz 不变的关系式

$$\bar{u}(\mathbf{p}, \lambda)u(\mathbf{p}, \lambda') = 2m\delta_{\lambda\lambda'}, \quad \bar{v}(\mathbf{p}, \lambda)v(\mathbf{p}, \lambda') = -2m\delta_{\lambda\lambda'}$$

$$\bar{u}(\mathbf{p}, \lambda)v(\mathbf{p}, \lambda') = \bar{v}(\mathbf{p}, \lambda)u(\mathbf{p}, \lambda') = 0$$

 另一方面，考虑螺旋度求和式

$$\begin{aligned} \sum_{\lambda=\pm} u(\mathbf{p}, \lambda)\bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) &= \sum_{\lambda=\pm} \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_\lambda(\mathbf{p}) \\ \omega_\lambda(\mathbf{p})\xi_\lambda(\mathbf{p}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_\lambda(\mathbf{p})\xi_\lambda^\dagger(\mathbf{p}) & \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_\lambda^\dagger(\mathbf{p}) \end{pmatrix} \\ &= \sum_{\lambda=\pm} \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\omega_\lambda(\mathbf{p})\xi_\lambda(\mathbf{p})\xi_\lambda^\dagger(\mathbf{p}) & \omega_{-\lambda}^2(\mathbf{p})\xi_\lambda(\mathbf{p})\xi_\lambda^\dagger(\mathbf{p}) \\ \omega_\lambda^2(\mathbf{p})\xi_\lambda(\mathbf{p})\xi_\lambda^\dagger(\mathbf{p}) & \omega_\lambda(\mathbf{p})\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_\lambda(\mathbf{p})\xi_\lambda^\dagger(\mathbf{p}) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

螺旋度求和

 利用

$$\omega_{\lambda}(\mathbf{p})\omega_{-\lambda}(\mathbf{p}) = m, \quad (p \cdot \bar{\sigma})\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) = \omega_{\lambda}^2(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p}), \quad (p \cdot \sigma)\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) = \omega_{-\lambda}^2(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p})$$

 以及 $\xi_{\lambda}(\mathbf{p})$ 的完备性关系 $\sum_{\lambda=\pm} \xi_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) = \mathbf{1}$, 推出

$$\begin{aligned} \sum_{\lambda=\pm} u(\mathbf{p}, \lambda)\bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) &= \sum_{\lambda=\pm} \begin{pmatrix} \omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\omega_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) & \omega_{-\lambda}^2(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) \\ \omega_{\lambda}^2(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) & \omega_{\lambda}(\mathbf{p})\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} \\ &= \sum_{\lambda=\pm} \begin{pmatrix} m\xi_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) & (p \cdot \sigma)\xi_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) \\ (p \cdot \bar{\sigma})\xi_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) & m\xi_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} m & p \cdot \sigma \\ p \cdot \bar{\sigma} & m \end{pmatrix} = p_{\mu}\gamma^{\mu} + m \end{aligned}$$

自旋求和关系

将 $(p \cdot \bar{\sigma})\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) = \omega_{\lambda}^2(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p})$ 和 $(p \cdot \sigma)\xi_{\lambda}(\mathbf{p}) = \omega_{-\lambda}^2(\mathbf{p})\xi_{\lambda}(\mathbf{p})$ 中的 λ 换成 $-\lambda$, 得

$$(p \cdot \bar{\sigma})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) = \omega_{-\lambda}^2(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}), \quad (p \cdot \sigma)\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) = \omega_{\lambda}^2(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p})$$

有 $\sum_{\lambda=\pm} v(\mathbf{p}, \lambda)\bar{v}(\mathbf{p}, \lambda)$

$$= \sum_{\lambda=\pm} \begin{pmatrix} \lambda\omega_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \\ -\lambda\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\lambda\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) & \lambda\omega_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{\lambda=\pm} \begin{pmatrix} -\lambda^2\omega_{\lambda}(\mathbf{p})\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) & \lambda^2\omega_{\lambda}^2(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) \\ \lambda^2\omega_{-\lambda}^2(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) & -\lambda^2\omega_{-\lambda}(\mathbf{p})\omega_{\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{\lambda=\pm} \begin{pmatrix} -m\xi_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) & (p \cdot \sigma)\xi_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) \\ (p \cdot \bar{\sigma})\xi_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) & -m\xi_{-\lambda}(\mathbf{p})\xi_{-\lambda}^{\dagger}(\mathbf{p}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -m & p \cdot \sigma \\ p \cdot \bar{\sigma} & -m \end{pmatrix} = p_{\mu}\gamma^{\mu} - m$$

整理一下, 有如下螺旋度求和关系, 或者说, **自旋求和关系**:

$$\sum_{\lambda=\pm} u(\mathbf{p}, \lambda)\bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) = \not{p} + m, \quad \sum_{\lambda=\pm} v(\mathbf{p}, \lambda)\bar{v}(\mathbf{p}, \lambda) = \not{p} - m$$

平面波展开

🚗 用 $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 把 Dirac 旋量场算符 $\psi(\mathbf{x}, t)$ 的平面波展开式

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda=\pm} \left[\varphi^{(+)}(\mathbf{x}, \mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} + \varphi^{(-)}(\mathbf{x}, \mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger \right]$$

写作

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda=\pm} \left[u(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + v(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \right]$$

💎 其中 $a_{\mathbf{p}, \lambda}$ 是湮灭算符, $b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger$ 是产生算符, 而且 $a_{\mathbf{p}, \lambda} \neq b_{\mathbf{p}, \lambda}$, 于是

$$\psi^\dagger(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda=\pm} \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \right]$$

$$\bar{\psi}(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda=\pm} \left[\bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + \bar{v}(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \right]$$

5.4.3 小节 哈密顿量和产生湮灭算符

 根据拉氏量 $\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi$ ， $\psi(x)$ 对应的共轭动量密度是

$$\pi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 \psi)} = i\bar{\psi}\gamma^0 = i\psi^\dagger$$

 它的平面波展开式为

$$\pi(\mathbf{x}, t) = i\psi^\dagger(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{i}{\sqrt{2E_p}} \sum_{\lambda=\pm} \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} \right]$$

 代入自由旋量场 $\psi(x)$ 满足的 Dirac 方程 $(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0$ ，拉氏量化为

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0$$

 因此，自由 Dirac 旋量场的哈密顿量密度为


$$\mathcal{H} = \pi \partial_0 \psi - \mathcal{L} = \pi \partial_0 \psi = i\psi^\dagger \partial_0 \psi$$

哈密顿量算符

 从而，哈密顿量算符为


$$\begin{aligned}
 H &= \int d^3x \mathcal{H} = \int d^3x \psi^\dagger i\partial_0 \psi \\
 &= \sum_{\lambda\lambda'} \int \frac{d^3x d^3p d^3q}{(2\pi)^6 \sqrt{4E_p E_q}} \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-ip \cdot x} \right] \\
 &\quad \times q_0 \left[u(\mathbf{q}, \lambda') a_{\mathbf{q}, \lambda'} e^{-iq \cdot x} - v(\mathbf{q}, \lambda') b_{\mathbf{q}, \lambda'}^\dagger e^{iq \cdot x} \right] \\
 &= \sum_{\lambda\lambda'} \int \frac{d^3x d^3p d^3q E_q}{(2\pi)^6 \sqrt{4E_p E_q}} \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{q}, \lambda') a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger a_{\mathbf{q}, \lambda'} e^{i(p-q) \cdot x} \right. \\
 &\quad - v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') b_{\mathbf{p}, \lambda} b_{\mathbf{q}, \lambda'}^\dagger e^{-i(p-q) \cdot x} \\
 &\quad - u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger b_{\mathbf{q}, \lambda'}^\dagger e^{i(p+q) \cdot x} \\
 &\quad \left. + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{q}, \lambda') b_{\mathbf{p}, \lambda} a_{\mathbf{q}, \lambda'} e^{-i(p+q) \cdot x} \right]
 \end{aligned}$$

化简哈密顿量


 积分，得

$$\begin{aligned}
 H &= \sum_{\lambda\lambda'} \int \frac{d^3p d^3q E_q}{(2\pi)^3 \sqrt{4E_p E_q}} \left\{ \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{q}, \lambda') a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{q},\lambda'} e^{i(E_p - E_q)t} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. - v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') b_{\mathbf{p},\lambda} b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger e^{-i(E_p - E_q)t} \right] \right. \\
 &\quad \left. + \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{q}) \left[-u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger e^{i(E_p + E_q)t} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{q}, \lambda') b_{\mathbf{p},\lambda} a_{\mathbf{q},\lambda'} e^{-i(E_p + E_q)t} \right] \right\} \\
 &= \sum_{\lambda\lambda'} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2} \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{p}, \lambda') a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda'} - v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{p}, \lambda') b_{\mathbf{p},\lambda} b_{\mathbf{p},\lambda'}^\dagger \right. \\
 &\quad \left. - u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(-\mathbf{p}, \lambda') a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p},\lambda'}^\dagger e^{2iE_p t} + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(-\mathbf{p}, \lambda') b_{\mathbf{p},\lambda} a_{-\mathbf{p},\lambda'} e^{-2iE_p t} \right] \\
 &\quad \quad \quad = 0 \quad \quad \quad = 0 \\
 &= \sum_{\lambda\lambda'} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2} (2E_p \delta_{\lambda\lambda'} a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda'} - 2E_p \delta_{\lambda\lambda'} b_{\mathbf{p},\lambda} b_{\mathbf{p},\lambda'}^\dagger) \quad \leftarrow \text{正交归一关系} \\
 &= \sum_{\lambda=\pm} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_p (a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda} - b_{\mathbf{p},\lambda} b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger)
 \end{aligned}$$

$a_{\mathbf{p},\lambda}$ 和 $a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$ 的表达式


 另一方面, 有

$$\begin{aligned}
 & \int d^3x e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) \psi(\mathbf{x}, t) \\
 = & \int \frac{d^3x d^3q}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_{\mathbf{q}}}} \sum_{\lambda'=\pm} \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{q}, \lambda') a_{\mathbf{q},\lambda'} e^{i(\mathbf{p}-\mathbf{q})\cdot\mathbf{x}} + u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger e^{i(\mathbf{p}+\mathbf{q})\cdot\mathbf{x}} \right] \\
 = & \int \frac{d^3q}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}}}} \sum_{\lambda'=\pm} \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{q}, \lambda') a_{\mathbf{q},\lambda'} e^{i(E_{\mathbf{p}}-E_{\mathbf{q}})t} \delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}) \right. \\
 & \left. + u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger e^{i(E_{\mathbf{p}}+E_{\mathbf{q}})t} \delta^{(3)}(\mathbf{p}+\mathbf{q}) \right] \\
 = & \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda'=\pm} \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{p}, \lambda') a_{\mathbf{p},\lambda'} + u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(-\mathbf{p}, \lambda') b_{-\mathbf{p},\lambda'}^\dagger e^{2iE_{\mathbf{p}}t} \right] \\
 = & \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda'=\pm} (2E_{\mathbf{p}} \delta_{\lambda\lambda'} a_{\mathbf{p},\lambda'}) = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p},\lambda}
 \end{aligned}$$


 从而将湮灭算符 $a_{\mathbf{p},\lambda}$ 和产生算符 $a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$ 表示为

$$a_{\mathbf{p},\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) \psi(\mathbf{x}, t), \quad a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \psi^\dagger(\mathbf{x}, t) u(\mathbf{p}, \lambda)$$

$b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$ 和 $b_{\mathbf{p},\lambda}$ 的表达式

 同理推出

$$\begin{aligned}
 & \int d^3x e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) \psi(\mathbf{x}, t) \\
 = & \int \frac{d^3x d^3q}{(2\pi)^3 \sqrt{2E_{\mathbf{q}}}} \sum_{\lambda'=\pm} \left[v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{q}, \lambda') a_{\mathbf{q},\lambda'} e^{-i(\mathbf{p}+\mathbf{q})\cdot\mathbf{x}} + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger e^{-i(\mathbf{p}-\mathbf{q})\cdot\mathbf{x}} \right] \\
 = & \int \frac{d^3q}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}}}} \sum_{\lambda'=\pm} \left[v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{q}, \lambda') a_{\mathbf{q},\lambda'} e^{-i(E_{\mathbf{p}}+E_{\mathbf{q}})t} \delta^{(3)}(\mathbf{p}+\mathbf{q}) \right. \\
 & \left. + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger e^{-i(E_{\mathbf{p}}-E_{\mathbf{q}})t} \delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q}) \right] \\
 = & \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda'=\pm} \left[v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(-\mathbf{p}, \lambda') a_{-\mathbf{p},\lambda'} e^{-2iE_{\mathbf{p}}t} + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{p}, \lambda') b_{\mathbf{p},\lambda'}^\dagger \right] \\
 = & \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda'=\pm} \left(2E_{\mathbf{p}} \delta_{\lambda\lambda'} b_{\mathbf{p},\lambda'}^\dagger \right) = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger
 \end{aligned}$$


 于是将产生算符 $b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$ 和湮灭算符 $b_{\mathbf{p},\lambda}$ 表示成

$$b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) \psi(\mathbf{x}, t), \quad b_{\mathbf{p},\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \psi^\dagger(\mathbf{x}, t) v(\mathbf{p}, \lambda)$$

5.5 节 Dirac 旋量场的正则量子化

5.5.1 小节 用等时对易关系量子化 Dirac 旋量场的困难

 回顾前面**标量场**和**矢量场**的**正则量子化**程序


 我们先假设场算符与其共轭动量密度算符满足**等时对易关系**

$$[\Phi_a(\mathbf{x}, t), \pi_b(\mathbf{y}, t)] = i\delta_{ab}\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

$$[\Phi_a(\mathbf{x}, t), \Phi_b(\mathbf{y}, t)] = [\pi_a(\mathbf{x}, t), \pi_b(\mathbf{y}, t)] = 0$$

 然后推导出**产生湮灭算符的对易关系**，再通过计算给出**正定的哈密顿量算符**

 对于**无质量矢量场**，则需要用**弱 Lorenz 规范条件**来得到**正的哈密顿量期待值**

 这些结果说明在量子场论中使用**正则量子化方法**是**合理的**

 本小节将尝试用类似的**等时对易关系**对 **Dirac 旋量场**进行量子化


 不过，我们会发现这种方法并**不能**给出正定的哈密顿量算符，因而是**不可行的**

等时对易关系

 假设 Dirac 旋量场算符 $\psi(x)$ 与其共轭动量密度算符 $\pi(x)$ 满足等时对易关系

$$[\psi_a(\mathbf{x}, t), \pi_b(\mathbf{y}, t)] = i\delta_{ab}\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad [\psi_a(\mathbf{x}, t), \psi_b(\mathbf{y}, t)] = [\pi_a(\mathbf{x}, t), \pi_b(\mathbf{y}, t)] = 0.$$

 这里将旋量指标明显地写出来

 由于 $\pi = i\psi^\dagger$ ，这些关系等价于 $\psi(x)$ 与 $\psi^\dagger(x)$ 的等时对易关系


$$[\psi_a(\mathbf{x}, t), \psi_b^\dagger(\mathbf{y}, t)] = \delta_{ab}\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad [\psi_a(\mathbf{x}, t), \psi_b(\mathbf{y}, t)] = [\psi_a^\dagger(\mathbf{x}, t), \psi_b^\dagger(\mathbf{y}, t)] = 0$$

等时对易关系


 假设 Dirac 旋量场算符 $\psi(x)$ 与其共轭动量密度算符 $\pi(x)$ 满足等时对易关系

$$[\psi_a(\mathbf{x}, t), \pi_b(\mathbf{y}, t)] = i\delta_{ab}\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad [\psi_a(\mathbf{x}, t), \psi_b(\mathbf{y}, t)] = [\pi_a(\mathbf{x}, t), \pi_b(\mathbf{y}, t)] = 0.$$

 这里将旋量指标明显地写出来

 由于 $\pi = i\psi^\dagger$ ，这些关系等价于 $\psi(x)$ 与 $\psi^\dagger(x)$ 的等时对易关系

$$[\psi_a(\mathbf{x}, t), \psi_b^\dagger(\mathbf{y}, t)] = \delta_{ab}\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad [\psi_a(\mathbf{x}, t), \psi_b(\mathbf{y}, t)] = [\psi_a^\dagger(\mathbf{x}, t), \psi_b^\dagger(\mathbf{y}, t)] = 0$$


 根据 $a_{\mathbf{p}, \lambda} = \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda)\psi(\mathbf{x}, t)$ ，推出

$$\begin{aligned} [a_{\mathbf{p}, \lambda}, a_{\mathbf{q}, \lambda'}^\dagger] &= \frac{1}{\sqrt{4E_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{q}}}} \int d^3x d^3y e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} - \mathbf{q}\cdot\mathbf{y})} u_a^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) [\psi_a(\mathbf{x}, t), \psi_b^\dagger(\mathbf{y}, t)] u_b(\mathbf{q}, \lambda') \\ &= \frac{1}{\sqrt{4E_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{q}}}} \int d^3x d^3y e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} - \mathbf{q}\cdot\mathbf{y})} u_a^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u_b(\mathbf{q}, \lambda') \delta_{ab}\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{4E_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{q}}}} \int d^3x e^{i(E_{\mathbf{p}} - E_{\mathbf{q}})t} e^{-i(\mathbf{p} - \mathbf{q})\cdot\mathbf{x}} u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{q}, \lambda') \\ &= \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{p}, \lambda') (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) = (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \end{aligned}$$


$$[b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger]$$

 根据

$$b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) \psi(\mathbf{x}, t), \quad b_{\mathbf{p},\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \int d^3x e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \psi^\dagger(\mathbf{x}, t) v(\mathbf{p}, \lambda)$$

 以及等时对易关系 $[\psi_a(\mathbf{x}, t), \psi_b^\dagger(\mathbf{y}, t)] = \delta_{ab} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ ，得到

$$\begin{aligned} [b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] &= \frac{1}{\sqrt{4E_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{q}}}} \int d^3x d^3y e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} - \mathbf{q}\cdot\mathbf{y})} v_b^\dagger(\mathbf{q}, \lambda') [\psi_a^\dagger(\mathbf{x}, t), \psi_b(\mathbf{y}, t)] v_a(\mathbf{p}, \lambda) \\ &= \frac{1}{\sqrt{4E_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{q}}}} \int d^3x d^3y e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} - \mathbf{q}\cdot\mathbf{y})} v_b^\dagger(\mathbf{q}, \lambda') v_a(\mathbf{p}, \lambda) (-\delta_{ba}) \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{4E_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{q}}}} \int d^3x e^{i(E_{\mathbf{p}} - E_{\mathbf{q}})t} e^{-i(\mathbf{p} - \mathbf{q})\cdot\mathbf{x}} v^\dagger(\mathbf{q}, \lambda') v(\mathbf{p}, \lambda) \\ &= -\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda') v(\mathbf{p}, \lambda) (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) = -(2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \end{aligned}$$

 这个结果非同寻常地多了一个**负号**

负能量困难

进一步计算，最终通过等时对易关系得到的产生湮灭算符对易关系为

$$[a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), \quad [a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}] = [a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] = 0$$

$$[b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] = -(2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), \quad [b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}] = [b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] = 0$$

$$[a_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] = [b_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] = [a_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}] = [a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] = 0$$


利用这样的对易关系，可以把哈密顿量算符化为

$$\begin{aligned} H &= \sum_{\lambda=\pm} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{p}} (a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda} - b_{\mathbf{p},\lambda} b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger) \\ &= \sum_{\lambda=\pm} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{p}} (a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda} - b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{\mathbf{p},\lambda}) + (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{0}) \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} 2E_{\mathbf{p}} \end{aligned}$$

负能量困难


 进一步计算，最终通过**等时对易关系**得到的**产生湮灭算符对易关系**为

$$\begin{aligned} [a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] &= (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), & [a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}] &= [a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] = 0 \\ [b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] &= -(2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), & [b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}] &= [b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] = 0 \\ [a_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] &= [b_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] = [a_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}] = [a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger] = 0 \end{aligned}$$

 利用这样的对易关系，可以把**哈密顿量算符**化为

$$\begin{aligned} H &= \sum_{\lambda=\pm} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{p}} (a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda} - b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{\mathbf{p},\lambda}) \\ &= \sum_{\lambda=\pm} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{p}} (a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda} - b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{\mathbf{p},\lambda}) + (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{0}) \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} 2E_{\mathbf{p}} \end{aligned}$$


 第二项是**零点能**，第一项中由 $(a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger)$ 描述的粒子对总能量的贡献为**正**


 但第一项中由 $(b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger)$ 描述的粒子对总能量的贡献为**负**


 **粒子数密度** $b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{\mathbf{p},\lambda}$ **越大**，场的**总能量越少**，显然是**非物理的**，出现**负能量困难**

 因此，用**等时对易关系**对 **Dirac 旋量场**进行量子化是**行不通的**

5.5.2 小节 用等时反对易关系量子化 Dirac 旋量场

 从以上哈密顿量算符计算过程看出，如果在交换 $b_{p,\lambda}$ 和 $b_{p,\lambda}^\dagger$ 位置的同时能够改变符号，就可以得到正定的哈密顿量算符

 因此，需要的不是 $b_{p,\lambda}$ 与 $b_{p,\lambda}^\dagger$ 的对易关系，而是反对易关系

 为了得到合适的 $b_{p,\lambda}$ 与 $b_{p,\lambda}^\dagger$ 的反对易关系，则需要舍弃等时对易关系

5.5.2 小节 用等时反对易关系量子化 Dirac 旋量场

🔧 从以上哈密顿量算符计算过程看出，如果在交换 $b_{p,\lambda}$ 和 $b_{p,\lambda}^\dagger$ 位置的同时能够改变符号，就可以得到正定的哈密顿量算符

📎 因此，需要的不是 $b_{p,\lambda}$ 与 $b_{p,\lambda}^\dagger$ 的对易关系，而是反对易关系

📎 为了得到合适的 $b_{p,\lambda}$ 与 $b_{p,\lambda}^\dagger$ 的反对易关系，则需要舍弃等时对易关系，代之以等时反对易关系

$$\{\psi_a(\mathbf{x}, t), \pi_b(\mathbf{y}, t)\} = i\delta_{ab}\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

$$\{\psi_a(\mathbf{x}, t), \psi_b(\mathbf{y}, t)\} = \{\pi_a(\mathbf{x}, t), \pi_b(\mathbf{y}, t)\} = 0$$

📌 采用反对易关系进行量子化的方法称为 Jordan-Wigner 量子化

📎 由于 $\pi = i\psi^\dagger$ ，这些关系等价于 ψ 与 ψ^\dagger 的等时反对易关系

$$\{\psi_a(\mathbf{x}, t), \psi_b^\dagger(\mathbf{y}, t)\} = \delta_{ab}\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

$$\{\psi_a(\mathbf{x}, t), \psi_b(\mathbf{y}, t)\} = \{\psi_a^\dagger(\mathbf{x}, t), \psi_b^\dagger(\mathbf{y}, t)\} = 0$$



Pascual Jordan
(1902–1980)



Eugene Wigner
(1902–1995)


哈密顿量的正定性

 通过等时反对易关系得到的产生湮灭算符反对易关系为

$$\{a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} = (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), \quad \{a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}\} = \{a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} = 0$$

$$\{b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} = (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), \quad \{b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}\} = \{b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} = 0$$

$$\{a_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} = \{b_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} = \{a_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}\} = \{a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} = 0$$

 可见, $(a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger)$ 和 $(b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger)$ 互不干扰, 各自描述一种粒子

哈密顿量的正定性


 通过等时反对易关系得到的产生湮灭算符反对易关系为

$$\begin{aligned} \{a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} &= (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), & \{a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}\} &= \{a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} = 0 \\ \{b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} &= (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}), & \{b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}\} &= \{b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} = 0 \\ \{a_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} &= \{b_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} = \{a_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}\} = \{a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} = 0 \end{aligned}$$

 可见, $(a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger)$ 和 $(b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger)$ 互不干扰, 各自描述一种粒子

 利用这样的反对易关系, 把哈密顿量算符化为

$$\begin{aligned} H &= \sum_{\lambda=\pm} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{p}} (a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda} - b_{\mathbf{p},\lambda} b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger) && \text{第二项是零点能} \\ &= \sum_{\lambda=\pm} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{p}} (a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda} + b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{\mathbf{p},\lambda}) - (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{0}) \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} 2E_{\mathbf{p}} \end{aligned}$$

 第一项是所有动量模式所有螺旋度所有粒子贡献的能量之和, 它是正定的


 可见, 用等时反对易关系对 Dirac 旋量场进行正则量子化是合适的

哈密顿量与产生湮灭算符的对易

 计算哈密顿量 H 与产生湮灭算符的对易子，得到

$$[H, a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger] = E_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, \quad [H, a_{\mathbf{p},\lambda}] = -E_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p},\lambda}$$

$$[H, b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger] = E_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, \quad [H, b_{\mathbf{p},\lambda}] = -E_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p},\lambda}$$

 设 $|E\rangle$ 是 H 的本征态，本征值为 E ，则 $H|E\rangle = E|E\rangle$


 从而推出


$$H a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |E\rangle = (a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger H + E_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger) |E\rangle = (E + E_{\mathbf{p}}) a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |E\rangle$$

$$H a_{\mathbf{p},\lambda} |E\rangle = (a_{\mathbf{p},\lambda} H - E_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p},\lambda}) |E\rangle = (E - E_{\mathbf{p}}) a_{\mathbf{p},\lambda} |E\rangle$$

$$H b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |E\rangle = (b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger H + E_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger) |E\rangle = (E + E_{\mathbf{p}}) b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |E\rangle$$

$$H b_{\mathbf{p},\lambda} |E\rangle = (b_{\mathbf{p},\lambda} H - E_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p},\lambda}) |E\rangle = (E - E_{\mathbf{p}}) b_{\mathbf{p},\lambda} |E\rangle$$

 当 $a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |E\rangle \neq 0$ 和 $b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |E\rangle \neq 0$ 时， $a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$ 和 $b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$ 的作用是使能量本征值增加 $E_{\mathbf{p}}$


 当 $a_{\mathbf{p},\lambda} |E\rangle \neq 0$ 和 $b_{\mathbf{p},\lambda} |E\rangle \neq 0$ 时， $a_{\mathbf{p},\lambda}$ 和 $b_{\mathbf{p},\lambda}$ 的作用是使能量本征值减少 $E_{\mathbf{p}}$

总动量算符


 Dirac 旋量场的总动量算符为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{P} &= - \int d^3x \pi \nabla \psi = \int d^3x \psi^\dagger (-i \nabla) \psi \\
 &= \sum_{\lambda \lambda'} \int \frac{d^3x d^3p d^3q}{(2\pi)^6 \sqrt{4E_p E_q}} \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \right] \\
 &\quad \times \left[\mathbf{q} u(\mathbf{q}, \lambda') a_{\mathbf{q}, \lambda'} e^{-i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} - \mathbf{q} v(\mathbf{q}, \lambda') b_{\mathbf{q}, \lambda'}^\dagger e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{x}} \right] \\
 &= \sum_{\lambda \lambda'} \int \frac{d^3p d^3q \mathbf{q}}{(2\pi)^3 \sqrt{4E_p E_q}} \left\{ \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{q}, \lambda') a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger a_{\mathbf{q}, \lambda'} e^{i(E_p - E_q)t} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. - v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') b_{\mathbf{p}, \lambda} b_{\mathbf{q}, \lambda'}^\dagger e^{-i(E_p - E_q)t} \right] \right. \\
 &\quad \left. + \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{q}) \left[- u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger b_{\mathbf{q}, \lambda'}^\dagger e^{i(E_p + E_q)t} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{q}, \lambda') b_{\mathbf{p}, \lambda} a_{\mathbf{q}, \lambda'} e^{-i(E_p + E_q)t} \right] \right\}
 \end{aligned}$$

化简总动量

 积分，得


$$\begin{aligned}
 \mathbf{P} &= \sum_{\lambda\lambda'} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2E_p} \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{p}, \lambda') a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda'} - v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{p}, \lambda') b_{\mathbf{p},\lambda} b_{\mathbf{p},\lambda'}^\dagger \right. \\
 &\quad \left. + u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(-\mathbf{p}, \lambda') a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p},\lambda'}^\dagger e^{2iE_p t} - v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(-\mathbf{p}, \lambda') b_{\mathbf{p},\lambda} a_{-\mathbf{p},\lambda'} e^{-2iE_p t} \right] \\
 &= \sum_{\lambda\lambda'} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{\mathbf{p}}{2E_p} (2E_p \delta_{\lambda\lambda'} a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda'} - 2E_p \delta_{\lambda\lambda'} b_{\mathbf{p},\lambda} b_{\mathbf{p},\lambda'}^\dagger) \\
 &= \sum_{\lambda=\pm} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \mathbf{p} (a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda} - b_{\mathbf{p},\lambda} b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger) \quad \rightarrow \{b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} = (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \\
 &= \sum_{\lambda=\pm} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \mathbf{p} (a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda} + b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{\mathbf{p},\lambda}) - 2\delta^{(3)}(\mathbf{0}) \int d^3p \mathbf{p} \\
 &= \sum_{\lambda=\pm} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \mathbf{p} (a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda} + b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{\mathbf{p},\lambda})
 \end{aligned}$$

 总动量是所有动量模式所有螺旋度所有粒子贡献的 **动量之和**


5.5.3 小节 U(1) 整体对称性

 类似于复标量场，Dirac 旋量场也具有 U(1) 整体对称性

 对 Dirac 旋量场 $\psi(x)$ 作 U(1) 整体变换 $\psi'(x) = e^{iq\theta} \psi(x)$


 则 $\psi^\dagger(x)$ 和 $\bar{\psi}(x)$ 的相应变换为

$$[\psi^\dagger(x)]' = [\psi'(x)]^\dagger = \psi^\dagger(x) e^{-iq\theta}, \quad [\bar{\psi}(x)]' = \bar{\psi}'(x) = [\psi'(x)]^\dagger \gamma^0 = \bar{\psi}(x) e^{-iq\theta}$$

 在此变换下，拉氏量不变，

$$\begin{aligned} \mathcal{L}'(x) &= \bar{\psi}'(x) (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi'(x) = \bar{\psi}(x) e^{-iq\theta} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) e^{iq\theta} \psi(x) \\ &= \bar{\psi}(x) (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi(x) = \mathcal{L}(x) \end{aligned}$$


 容易验证，前面列举的旋量双线性型都在这种 U(1) 整体变换下不变


 因此，用这些旋量双线性型构造的拉氏量都具有 U(1) 整体对称性

U(1) 守恒流

 U(1) 整体变换的无穷小形式为

$$\psi'(x) = \psi(x) + iq\theta\psi(x)$$

 由于 $\delta x^\mu = 0$, $\bar{\delta}\psi = \delta\psi = iq\theta\psi$

 按照 $j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \Phi_a)} \bar{\delta}\Phi_a + \mathcal{L}\delta x^\mu$, 相应的 Noether 守恒流为

$$j^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \psi)} \bar{\delta}\psi = i\bar{\psi}\gamma^\mu(iq\theta\psi) = -q\theta\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$$

 扔掉无穷小参数 $-\theta$, 定义 U(1) 守恒流算符

$$J^\mu \equiv q\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$$

 则 Noether 定理给出


$$\partial_\mu J^\mu = 0$$

U(1) 守恒荷

 相应的 U(1) 守恒荷算符为


$$\begin{aligned}
 Q &= \int d^3x J^0 = q \int d^3x \bar{\psi} \gamma^0 \psi = q \int d^3x \psi^\dagger \psi \\
 &= q \sum_{\lambda\lambda'} \int \frac{d^3x d^3p d^3k}{(2\pi)^6 \sqrt{4E_p E_k}} \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) b_{\mathbf{p}, \lambda} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \right] \\
 &\quad \times \left[u(\mathbf{k}, \lambda') a_{\mathbf{k}, \lambda'} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} + v(\mathbf{k}, \lambda') b_{\mathbf{k}, \lambda'}^\dagger e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \right] \\
 &= q \sum_{\lambda\lambda'} \int \frac{d^3p d^3k}{(2\pi)^3 \sqrt{4E_p E_k}} \left\{ \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{k}) \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{k}, \lambda') a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger a_{\mathbf{k}, \lambda'} e^{i(E_p - E_k)t} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{k}, \lambda') b_{\mathbf{p}, \lambda} b_{\mathbf{k}, \lambda'}^\dagger e^{-i(E_p - E_k)t} \right] \right. \\
 &\quad \left. + \delta^{(3)}(\mathbf{p} + \mathbf{k}) \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{k}, \lambda') a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger b_{\mathbf{k}, \lambda'}^\dagger e^{i(E_p + E_k)t} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{k}, \lambda') b_{\mathbf{p}, \lambda} a_{\mathbf{k}, \lambda'} e^{-i(E_p + E_k)t} \right] \right\}
 \end{aligned}$$

正粒子和反粒子


 积分, 得

$$\begin{aligned}
 Q &= q \sum_{\lambda\lambda'} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{p}, \lambda') a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger a_{\mathbf{p}, \lambda'} + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{p}, \lambda') b_{\mathbf{p}, \lambda} b_{\mathbf{p}, \lambda'}^\dagger \right. \\
 &\quad \left. + u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(-\mathbf{p}, \lambda') a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p}, \lambda'}^\dagger e^{2iE_p t} + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(-\mathbf{p}, \lambda') b_{\mathbf{p}, \lambda} a_{-\mathbf{p}, \lambda'} e^{-2iE_p t} \right] \\
 &= q \sum_{\lambda\lambda'} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} (2E_p \delta_{\lambda\lambda'} a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger a_{\mathbf{p}, \lambda'} + 2E_p \delta_{\lambda\lambda'} b_{\mathbf{p}, \lambda} b_{\mathbf{p}, \lambda'}^\dagger) \\
 &= q \sum_{\lambda=\pm} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} (a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger a_{\mathbf{p}, \lambda} + b_{\mathbf{p}, \lambda} b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger) \quad \text{👉 } \{b_{\mathbf{p}, \lambda}, b_{\mathbf{q}, \lambda'}^\dagger\} = (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \\
 &= \sum_{\lambda=\pm} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} (q a_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger a_{\mathbf{p}, \lambda} - q b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger b_{\mathbf{p}, \lambda}) + 2\delta^{(3)}(\mathbf{0}) \int d^3p q \quad (\text{零点荷})
 \end{aligned}$$


正粒子和反粒子

 积分，得

$$\begin{aligned}
 Q &= q \sum_{\lambda\lambda'} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} \left[u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(\mathbf{p}, \lambda') a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda'} + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{p}, \lambda') b_{\mathbf{p},\lambda} b_{\mathbf{p},\lambda'}^\dagger \right. \\
 &\quad \left. + u^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) v(-\mathbf{p}, \lambda') a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{-\mathbf{p},\lambda'}^\dagger e^{2iE_p t} + v^\dagger(\mathbf{p}, \lambda) u(-\mathbf{p}, \lambda') b_{\mathbf{p},\lambda} a_{-\mathbf{p},\lambda'} e^{-2iE_p t} \right] \\
 &= q \sum_{\lambda\lambda'} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} (2E_p \delta_{\lambda\lambda'} a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda'} + 2E_p \delta_{\lambda\lambda'} b_{\mathbf{p},\lambda} b_{\mathbf{p},\lambda'}^\dagger) \\
 &= q \sum_{\lambda=\pm} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} (a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda} + b_{\mathbf{p},\lambda} b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger) \quad \text{👉 } \{b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} = (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \\
 &= \sum_{\lambda=\pm} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} (q a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{p},\lambda} - q b_{\mathbf{p},\lambda} b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger) + 2\delta^{(3)}(\mathbf{0}) \int d^3p q \quad (\text{零点荷})
 \end{aligned}$$

 从第一项可以看出，由 $(a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger)$ 描述的粒子是**正粒子**，携带的 **U(1) 荷** 为 q

 由 $(b_{\mathbf{p},\lambda}, b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger)$ 描述的粒子是**反粒子**，携带的 **U(1) 荷** 为 $-q$

 除去**零点荷**，总荷是所有动量模式所有螺旋度所有正反粒子贡献的 **U(1) 荷之和**

5.5.4 小节 粒子态

✈ 对于自由 Dirac 旋量场，真空态 $|0\rangle$ 定义为被任意 $a_{\mathbf{p},\lambda}$ 和任意 $b_{\mathbf{p},\lambda}$ 湮灭的态，

$$a_{\mathbf{p},\lambda} |0\rangle = b_{\mathbf{p},\lambda} |0\rangle = 0$$

🐢 满足

$$\langle 0|0\rangle = 1, \quad H|0\rangle = E_{\text{vac}}|0\rangle, \quad E_{\text{vac}} = -2\delta^{(3)}(\mathbf{0}) \int d^3p E_{\mathbf{p}}$$

🦎 动量为 \mathbf{p} 、螺旋度为 λ 的单个正粒子态和单个反粒子态分别定义为

$$|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle \equiv \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |0\rangle, \quad |\mathbf{p}^-, \lambda\rangle \equiv \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |0\rangle$$

5.5.4 小节 粒子态

✈ 对于自由 Dirac 旋量场，真空态 $|0\rangle$ 定义为被任意 $a_{\mathbf{p},\lambda}$ 和任意 $b_{\mathbf{p},\lambda}$ 湮灭的态，

$$a_{\mathbf{p},\lambda} |0\rangle = b_{\mathbf{p},\lambda} |0\rangle = 0$$

🐢 满足

$$\langle 0|0\rangle = 1, \quad H|0\rangle = E_{\text{vac}}|0\rangle, \quad E_{\text{vac}} = -2\delta^{(3)}(\mathbf{0}) \int d^3p E_{\mathbf{p}}$$

🦎 动量为 \mathbf{p} 、螺旋度为 λ 的单个正粒子态和单个反粒子态分别定义为

$$|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle \equiv \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |0\rangle, \quad |\mathbf{p}^-, \lambda\rangle \equiv \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |0\rangle$$

🐍 根据产生湮灭算符的反对易关系，单粒子态的内积是

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{q}^+, \lambda' | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle &= \sqrt{4E_{\mathbf{q}}E_{\mathbf{p}}} \langle 0 | a_{\mathbf{q},\lambda'} a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger | 0 \rangle \\ &= \sqrt{4E_{\mathbf{q}}E_{\mathbf{p}}} \langle 0 | [(2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) - a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger a_{\mathbf{q},\lambda'}] | 0 \rangle \\ &= 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \end{aligned}$$

$$\langle \mathbf{q}^-, \lambda' | \mathbf{p}^-, \lambda \rangle = \sqrt{4E_{\mathbf{q}}E_{\mathbf{p}}} \langle 0 | b_{\mathbf{q},\lambda'} b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger | 0 \rangle = 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q})$$

$$\langle \mathbf{q}^-, \lambda' | \mathbf{p}^+, \lambda \rangle = \sqrt{4E_{\mathbf{q}}E_{\mathbf{p}}} \langle 0 | b_{\mathbf{q},\lambda'} a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger | 0 \rangle = -\sqrt{4E_{\mathbf{q}}E_{\mathbf{p}}} \langle 0 | a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger b_{\mathbf{q},\lambda'} | 0 \rangle = 0$$

单粒子态的能量本征值

✈ 根据 $Ha_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |E\rangle = (E + E_{\mathbf{p}})a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |E\rangle$ 和 $Hb_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |E\rangle = (E + E_{\mathbf{p}})b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |E\rangle$ ，有

$$H|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle = (E_{\text{vac}} + E_{\mathbf{p}})|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle, \quad H|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle = (E_{\text{vac}} + E_{\mathbf{p}})|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle$$

👤 可见， $|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle$ 和 $|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle$ 都比真空态多了一份能量 $E_{\mathbf{p}} = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2}$

单粒子态的能量本征值

✈ 根据 $Ha_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |E\rangle = (E + E_{\mathbf{p}})a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |E\rangle$ 和 $Hb_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |E\rangle = (E + E_{\mathbf{p}})b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |E\rangle$, 有

$$H|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle = (E_{\text{vac}} + E_{\mathbf{p}})|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle, \quad H|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle = (E_{\text{vac}} + E_{\mathbf{p}})|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle$$

🦎 可见, $|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle$ 和 $|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle$ 都比真空态多了一份能量 $E_{\mathbf{p}} = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2}$


🦎 将 $\psi(x)$ 的平面波解代入 $[\psi(x), \mathbf{J}] = (\hat{\mathbf{L}} + \mathbf{S})\psi(x)$ 左边, 得

$$[\psi(x), \mathbf{J}] = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda=\pm} \left\{ u(\mathbf{p}, \lambda)[a_{\mathbf{p},\lambda}, \mathbf{J}]e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda)[b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, \mathbf{J}]e^{ip \cdot x} \right\}$$


🦎 代入右边, 得

$$\begin{aligned} & (\hat{\mathbf{L}} + \mathbf{S})\psi(x) \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda=\pm} (-i\mathbf{x} \times \nabla + \mathbf{S}) \left[u(\mathbf{p}, \lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}e^{-ip \cdot x} + v(\mathbf{p}, \lambda)b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right] \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda=\pm} \left[(\mathbf{x} \times \mathbf{p} + \mathbf{S})u(\mathbf{p}, \lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}e^{-ip \cdot x} + (-\mathbf{x} \times \mathbf{p} + \mathbf{S})v(\mathbf{p}, \lambda)b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger e^{ip \cdot x} \right] \end{aligned}$$

$[a_{\mathbf{p},\lambda}, 2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}]$ 和 $[b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, 2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}]$


 两相比较，对于动量 \mathbf{p} 和螺旋度 λ ，有

$$u(\mathbf{p}, \lambda)[a_{\mathbf{p},\lambda}, \mathbf{J}] = (\mathbf{x} \times \mathbf{p} + \mathcal{S})u(\mathbf{p}, \lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}, \quad v(\mathbf{p}, \lambda)[b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, \mathbf{J}] = (-\mathbf{x} \times \mathbf{p} + \mathcal{S})v(\mathbf{p}, \lambda)b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$$


 按照前面讨论， $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 分别是本征值为 λ 和 $-\lambda$ 的螺旋度本征态，故

$$\begin{aligned} u(\mathbf{p}, \lambda)[a_{\mathbf{p},\lambda}, 2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}] &= 2\hat{\mathbf{p}} \cdot (\mathbf{x} \times \mathbf{p} + \mathcal{S})u(\mathbf{p}, \lambda)a_{\mathbf{p},\lambda} \\ &= (2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathcal{S})u(\mathbf{p}, \lambda)a_{\mathbf{p},\lambda} = \lambda u(\mathbf{p}, \lambda)a_{\mathbf{p},\lambda} \end{aligned}$$

$[a_{\mathbf{p},\lambda}, 2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}]$ 和 $[b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, 2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}]$

 两相比较，对于动量 \mathbf{p} 和螺旋度 λ ，有


$$u(\mathbf{p}, \lambda)[a_{\mathbf{p},\lambda}, \mathbf{J}] = (\mathbf{x} \times \mathbf{p} + \mathcal{S})u(\mathbf{p}, \lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}, \quad v(\mathbf{p}, \lambda)[b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, \mathbf{J}] = (-\mathbf{x} \times \mathbf{p} + \mathcal{S})v(\mathbf{p}, \lambda)b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$$

 按照前面讨论， $u(\mathbf{p}, \lambda)$ 和 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 分别是本征值为 λ 和 $-\lambda$ 的螺旋度本征态，故

$$\begin{aligned} u(\mathbf{p}, \lambda)[a_{\mathbf{p},\lambda}, 2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}] &= 2\hat{\mathbf{p}} \cdot (\mathbf{x} \times \mathbf{p} + \mathcal{S})u(\mathbf{p}, \lambda)a_{\mathbf{p},\lambda} \\ &= (2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathcal{S})u(\mathbf{p}, \lambda)a_{\mathbf{p},\lambda} = \lambda u(\mathbf{p}, \lambda)a_{\mathbf{p},\lambda} \\ v(\mathbf{p}, \lambda)[b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, 2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}] &= 2\hat{\mathbf{p}} \cdot (-\mathbf{x} \times \mathbf{p} + \mathcal{S})v(\mathbf{p}, \lambda)b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \\ &= (2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathcal{S})v(\mathbf{p}, \lambda)b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger = -\lambda v(\mathbf{p}, \lambda)b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger \end{aligned}$$

 因而

$$[a_{\mathbf{p},\lambda}, 2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}] = \lambda a_{\mathbf{p},\lambda}, \quad [b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger, 2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}] = -\lambda b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$$

 由于 \mathbf{J} 是厄米算符，对第一式取厄米共轭得

$$\lambda a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger = [a_{\mathbf{p},\lambda}, 2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}]^\dagger = (2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J})a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger - a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger(2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}) = [2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}, a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger]$$

单粒子态的螺旋度本征值

于是, $[2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}, a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger] = \lambda a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$, $[2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}, b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger] = \lambda b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$

\mathbf{J} 是总角动量算符, 真空态 $|0\rangle$ 满足 $\mathbf{J}|0\rangle = \mathbf{0}$, 由此得到

$$(2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J})a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |0\rangle = [a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger(2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}) + \lambda a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger] |0\rangle = \lambda a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |0\rangle$$

$$(2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J})b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |0\rangle = [b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger(2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}) + \lambda b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger] |0\rangle = \lambda b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |0\rangle$$

自由的单粒子态没有轨道角动量, 而 $2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}$ 相当于归一化的螺旋度算符

单粒子态的螺旋度本征值

于是, $[2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}, a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger] = \lambda a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$, $[2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}, b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger] = \lambda b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$

\mathbf{J} 是总角动量算符, 真空态 $|0\rangle$ 满足 $\mathbf{J}|0\rangle = \mathbf{0}$, 由此得到

$$(2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J})a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |0\rangle = [a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger(2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}) + \lambda a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger] |0\rangle = \lambda a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |0\rangle$$

$$(2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J})b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |0\rangle = [b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger(2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}) + \lambda b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger] |0\rangle = \lambda b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger |0\rangle$$

自由的单粒子态没有轨道角动量, 而 $2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}$ 相当于归一化的螺旋度算符

因此, 上面两式说明 $|\mathbf{p}^+, \lambda\rangle$ 和 $|\mathbf{p}^-, \lambda\rangle$ 都是螺旋度本征态, 本征值为 λ :


$$(2\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J})|\mathbf{p}^\pm, \lambda\rangle = \lambda|\mathbf{p}^\pm, \lambda\rangle$$


以上讨论表明, 产生算符 $a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$ 的作用是产生一个动量为 \mathbf{p} 、螺旋度为 λ 的正粒子


另一种产生算符 $b_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger$ 的作用是产生一个动量为 \mathbf{p} 、螺旋度为 λ 的反粒子

正粒子和反粒子具有相同的质量 m


湮灭算符的作用


 在 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) = \tilde{C}_\lambda \xi_{-\lambda}(\mathbf{p})$ 中，我们选择让 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p})$ 正比于 $\xi_{-\lambda}(\mathbf{p})$ ，使得 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 的螺旋度本征值为 $-\lambda$ ，从而得到 $b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger |0\rangle$ 的螺旋度本征值为 λ 的结果


 如果我们选择让 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p})$ 正比于 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ ，依照上述推导， $b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger |0\rangle$ 的螺旋度本征值就会变成 $-\lambda$ ，则 $(b_{\mathbf{p}, \lambda}, b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger)$ 将描述螺旋度为 $-\lambda$ 的反粒子

 这不符合我们的记号，因此，我们将 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p})$ 取为 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) = \tilde{C}_\lambda \xi_{-\lambda}(\mathbf{p})$

湮灭算符的作用

 在 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) = \tilde{C}_\lambda \xi_{-\lambda}(\mathbf{p})$ 中，我们选择让 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p})$ 正比于 $\xi_{-\lambda}(\mathbf{p})$ ，使得 $v(\mathbf{p}, \lambda)$ 的螺旋度本征值为 $-\lambda$ ，从而得到 $b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger |0\rangle$ 的螺旋度本征值为 λ 的结果

 如果我们选择让 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p})$ 正比于 $\xi_\lambda(\mathbf{p})$ ，依照上述推导， $b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger |0\rangle$ 的螺旋度本征值就会变成 $-\lambda$ ，则 $(b_{\mathbf{p}, \lambda}, b_{\mathbf{p}, \lambda}^\dagger)$ 将描述螺旋度为 $-\lambda$ 的反粒子


 这不符合我们的记号，因此，我们将 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p})$ 取为 $\tilde{f}_\lambda(\mathbf{p}) = \tilde{C}_\lambda \xi_{-\lambda}(\mathbf{p})$

 由产生湮灭算符的反对易关系，有

$$\begin{aligned} a_{\mathbf{p}, \lambda} |q^+, \lambda'\rangle &= \sqrt{2E_q} a_{\mathbf{p}, \lambda} a_{q, \lambda'}^\dagger |0\rangle = \sqrt{2E_q} [(2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) - a_{q, \lambda'}^\dagger a_{\mathbf{p}, \lambda}] |0\rangle \\ &= \sqrt{2E_q} (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) |0\rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_{\mathbf{p}, \lambda} |q^-, \lambda'\rangle &= \sqrt{2E_q} b_{\mathbf{p}, \lambda} b_{q, \lambda'}^\dagger |0\rangle = \sqrt{2E_q} [(2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) - b_{q, \lambda'}^\dagger b_{\mathbf{p}, \lambda}] |0\rangle \\ &= \sqrt{2E_q} (2\pi)^3 \delta_{\lambda\lambda'} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) |0\rangle \end{aligned}$$

 可以看出，湮灭算符 $a_{\mathbf{p}, \lambda}$ 的作用是减少一个动量为 \mathbf{p} 、螺旋度为 λ 的正粒子


 湮灭算符 $b_{\mathbf{p}, \lambda}$ 的作用是减少一个动量为 \mathbf{p} 、螺旋度为 λ 的反粒子

粒子交换

 将包含 **2 个正粒子**和 **2 个反粒子**的态记为

$$|p_1^+, \lambda_1; p_2^+, \lambda_2; p_3^-, \lambda_3; p_4^-, \lambda_4\rangle \equiv \sqrt{16E_{p_1}E_{p_2}E_{p_3}E_{p_4}} a_{p_1, \lambda_1}^\dagger a_{p_2, \lambda_2}^\dagger b_{p_3, \lambda_3}^\dagger b_{p_4, \lambda_4}^\dagger |0\rangle$$

 多次利用**反对易关系** $\{a_{p, \lambda}^\dagger, a_{q, \lambda'}^\dagger\} = \{b_{p, \lambda}^\dagger, b_{q, \lambda'}^\dagger\} = \{a_{p, \lambda}^\dagger, b_{q, \lambda'}^\dagger\} = 0$

 调换产生算符的位置，可得

$$a_{p_1, \lambda_1}^\dagger a_{p_2, \lambda_2}^\dagger b_{p_3, \lambda_3}^\dagger b_{p_4, \lambda_4}^\dagger |0\rangle = -b_{p_4, \lambda_4}^\dagger a_{p_2, \lambda_2}^\dagger b_{p_3, \lambda_3}^\dagger a_{p_1, \lambda_1}^\dagger |0\rangle$$

 **负号**源自**奇数次反对易**，从而

$$|p_1^+, \lambda_1; p_2^+, \lambda_2; p_3^-, \lambda_3; p_4^-, \lambda_4\rangle = -|p_4^-, \lambda_4; p_2^+, \lambda_2; p_3^-, \lambda_3; p_1^+, \lambda_1\rangle$$

 即**交换第 1 和第 4 个粒子**得到的态与原来的态相差一个**负号**

 同理，**交换其中任意两个粒子**，也会出现一个**负号**

费米子与 Pauli 不相容原理

🦋 一般地，对于多个全同粒子的态，**交换任意两个全同粒子**，需要对**产生算符**进行**奇数次反对易**，得到的态与原态相差一个**负号**

🐘 也就是说，态对**全同粒子交换**是**反对称的**

🐘 这说明 **Dirac 旋量场**描述的粒子是一种**费米子**，称为 **Dirac 费米子**，服从 **Fermi-Dirac 统计**

🐘 得到这个结论的关键在于两个**产生算符反对易**



Enrico Fermi
(1901–1954)

费米子与 Pauli 不相容原理

🦋 一般地，对于多个全同粒子的态，**交换任意两个全同粒子**，需要对**产生算符**进行**奇数次反对易**，得到的态与原态相差一个**负号**

🐘 也就是说，态对**全同粒子交换**是**反对称的**

🐘 这说明 **Dirac 旋量场**描述的粒子是一种**费米子**，称为 **Dirac 费米子**，服从 **Fermi-Dirac 统计**

🐘 得到这个结论的关键在于两个**产生算符反对易**

🦋 对于两个**相同**的产生算符 $a_{p,\lambda}^\dagger$ 或 $b_{p,\lambda}^\dagger$ ，反对易关系导致

$$a_{p,\lambda}^\dagger a_{p,\lambda}^\dagger |0\rangle = -a_{p,\lambda}^\dagger a_{p,\lambda}^\dagger |0\rangle, \quad b_{p,\lambda}^\dagger b_{p,\lambda}^\dagger |0\rangle = -b_{p,\lambda}^\dagger b_{p,\lambda}^\dagger |0\rangle$$

🐘 故

$$a_{p,\lambda}^\dagger a_{p,\lambda}^\dagger |0\rangle = 0, \quad b_{p,\lambda}^\dagger b_{p,\lambda}^\dagger |0\rangle = 0$$

🦋 没有其它自由度时，**不存在动量和螺旋度都相同的两个正费米子或两个反费米子组成的态**，这符合 **Pauli 不相容原理**




Enrico Fermi
(1901–1954)




Wolfgang Ernst Pauli
(1900–1958)


自旋—统计定理

 在第 2 章和第 4 章中，我们分别讨论了自旋为 0 的标量场和自旋为 1 的矢量场，合适的处理方式是通过**对易关系**对它们进行量子化，因而它们都描述**玻色子**

 在本章中，我们需要采用**反对易关系**才能对**自旋为 1/2** 的**旋量场**进行合适的量子化，因而旋量场描述的粒子是**费米子**


 实际上，这样的状况是普遍的，存在下列**自旋—统计定理**

自旋—统计定理


 **整数自旋**的物理场必须用**对易关系**进行量子化，对应的粒子是**玻色子**

 **半奇数自旋**的物理场必须用**反对易关系**进行量子化，对应的粒子是**费米子**


自旋—统计定理

 在第 2 章和第 4 章中，我们分别讨论了自旋为 0 的标量场和自旋为 1 的矢量场，合适的处理方式是通过**对易关系**对它们进行量子化，因而它们都描述**玻色子**


 在本章中，我们需要采用**反对易关系**才能对自旋为 $1/2$ 的**旋量场**进行合适的量子化，因而旋量场描述的粒子是**费米子**


 实际上，这样的状况是普遍的，存在下列**自旋—统计定理**

自旋—统计定理


 **整数自旋**的物理场必须用**对易关系**进行量子化，对应的粒子是**玻色子**


 **半奇数自旋**的物理场必须用**反对易关系**进行量子化，对应的粒子是**费米子**

 可从多个角度证明这个定理成立，前面已说明**哈密顿量算符的正定性**要求它成立

 此外，也可以从**交换全同粒子的路径依赖性**、**散射矩阵的 Lorentz 不变性**、**因果性**的角度加以证明（详细讨论见 M. D. Schwartz 的书 *Quantum Field Theory and the Standard Model* 第 12 章）

双粒子态内积

 记两个**正费米子**组成的**双粒子态**为 $|\mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2\rangle \equiv \sqrt{4E_{\mathbf{p}_1} E_{\mathbf{p}_2}} a_{\mathbf{p}_1, \lambda_1}^\dagger a_{\mathbf{p}_2, \lambda_2}^\dagger |0\rangle$

 双粒子态的**内积**关系是

$$\begin{aligned}
 & \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda'_1; \mathbf{q}_2^+, \lambda'_2 | \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2 \rangle \\
 &= \sqrt{16E_{\mathbf{p}_1} E_{\mathbf{p}_2} E_{\mathbf{q}_1} E_{\mathbf{q}_2}} \langle 0 | a_{\mathbf{q}_2, \lambda'_2} a_{\mathbf{q}_1, \lambda'_1} a_{\mathbf{p}_1, \lambda_1}^\dagger a_{\mathbf{p}_2, \lambda_2}^\dagger | 0 \rangle \\
 &= \sqrt{16E_{\mathbf{p}_1} E_{\mathbf{p}_2} E_{\mathbf{q}_1} E_{\mathbf{q}_2}} \left[(2\pi)^3 \delta_{\lambda_1 \lambda'_1} \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_1) \langle 0 | a_{\mathbf{q}_2, \lambda'_2} a_{\mathbf{p}_2, \lambda_2}^\dagger | 0 \rangle \right. \\
 & \quad \left. - \langle 0 | a_{\mathbf{q}_2, \lambda'_2} a_{\mathbf{p}_1, \lambda_1}^\dagger a_{\mathbf{q}_1, \lambda'_1} a_{\mathbf{p}_2, \lambda_2}^\dagger | 0 \rangle \right] \\
 &= \sqrt{16E_{\mathbf{p}_1} E_{\mathbf{p}_2} E_{\mathbf{q}_1} E_{\mathbf{q}_2}} \left[(2\pi)^3 \delta_{\lambda_1 \lambda'_1} \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_1) \langle 0 | a_{\mathbf{q}_2, \lambda'_2} a_{\mathbf{p}_2, \lambda_2}^\dagger | 0 \rangle \right. \\
 & \quad \left. - (2\pi)^3 \delta_{\lambda_2 \lambda'_1} \delta^{(3)}(\mathbf{p}_2 - \mathbf{q}_1) \langle 0 | a_{\mathbf{q}_2, \lambda'_2} a_{\mathbf{p}_1, \lambda_1}^\dagger | 0 \rangle \right] \\
 &= 4E_{\mathbf{p}_1} E_{\mathbf{p}_2} (2\pi)^6 \left[\delta_{\lambda_1 \lambda'_1} \delta_{\lambda_2 \lambda'_2} \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_1) \delta^{(3)}(\mathbf{p}_2 - \mathbf{q}_2) \right. \\
 & \quad \left. - \delta_{\lambda_1 \lambda'_2} \delta_{\lambda_2 \lambda'_1} \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_2) \delta^{(3)}(\mathbf{p}_2 - \mathbf{q}_1) \right]
 \end{aligned}$$

 最后两行方括号中第二项前面有一个**负号**，由**产生湮灭算符的反对易关系**引起

 这是**双费米子态内积**关系与**双玻色子态内积**关系在形式上的**不同**之处