# 量子场论 第7章 Feynman图 7.1节和7.2节

#### 余钊焕

中山大学物理学院

https://yzhxxzxy.github.io



更新日期: 2025年6月30日



#### 第7章 Feynman 图

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

\_\_\_\_\_

← 上一章告诉我们,为了预言像散射截面  $\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_A E_B v_{Mol}} \int d\Pi_n |\mathcal{M}|^2$  和衰变 宽度  $\Gamma = \frac{1}{S} \frac{1}{2m_A} \int d\Pi_n |\mathcal{M}|^2$  这样的实验观测量,需要计算不变振幅 i $\mathcal{M}$ ,它来自

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

T 矩阵元  $iT_{fi} = \langle f | iT | i \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) i\mathcal{M}$ 

🖋 对于 T 矩阵元所涉及的场算符的时序乘积,Wick 定理提供了处理方法

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

\_\_\_\_\_

← 上一章告诉我们,为了预言像散射截面  $\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_A E_B v_{Mol}} \int d\Pi_n |\mathcal{M}|^2 \mathbf{n}$ 衰变

阶 Feynman 图

<mark>宽度</mark>  $\Gamma = rac{1}{\mathcal{S}} rac{1}{2m_{\mathcal{A}}} \int \mathrm{d}\Pi_n \left| \mathcal{M} \right|^2$ 这样的实验观测量,需要计算不变振幅 i $\mathcal{M}$ ,它来自

T 矩阵元  $iT_{fi} = \langle f | iT | i \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) i\mathcal{M}$ 

🦋 对于 T 矩阵元所涉及的场算符的时序乘积,Wick 定理提供了处理方法

▲ 对微扰论某一阶应用 Wick 定理,能够得到散射振幅的表达式,而且相应的相互 作用过程可以用 Feynman 图 (diagram) 表示出来

Feynman 图上的元素具有对应的表达式,这种对应就是
 Feynman 规则 (rule)



Richard Feynman (1918–1988)

阶 Feynman 图

Yukawa 理论

00000000

阶 Feynman 图

宽度  $\Gamma = \frac{1}{S} \frac{1}{2m_A} \int d\Pi_n |\mathcal{M}|^2$  这样的实验观测量,需要计算不变振幅 i $\mathcal{M}$ ,它来自

T 矩阵元  $iT_{fi} = \langle f | iT | i \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) i\mathcal{M}$ 

🦋 对于 T 矩阵元所涉及的场算符的时序乘积,Wick 定理提供了处理方法

▲ 对微扰论某一阶应用 Wick 定理,能够得到散射振幅的表达式,而且相应的相互 作用过程可以用 Feynman 图 (diagram)表示出来

Feynman 图上的元素具有对应的表达式,这种对应就是 Feynman 规则 (rule)

🌙 使用 Feynman 图方法可以大大地简化计算过程:

🦻 将一个相互作用理论的 Feynman 规则归纳出来

🌔 绕开应用 Wick 定理的繁琐计算,对于特定相互作用过程 直接画出 Feynman 图







第 7 章 Feynman 图 7.1 节和 7.2 节

#### 7.1 节 Yukawa 理论

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

00000000

#### 7.1 节 Yukawa 理论

余钊焕(中山大学)

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

 ${igsilon \psi}$  实标量场  $\phi(x)$  和 Dirac 旋量场  $\psi(x)$  的 Yukawa 理论拉氏量  $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{
m S} + \mathcal{L}_{
m D} + \mathcal{L}_{
m Y}$ igoplus e 由于  $\mathcal{L}_{ ext{Y}}$  不包含场的时空导数,场的共轭动量密度不受  $\mathcal{L}_{ ext{Y}}$  影响 「 相互作用哈密顿量密度  $\mathcal{H}_1(x) = -\mathcal{L}_Y(x) = \kappa \phi(x) \overline{\psi}(x) \psi(x)$ **b** S 算符表达为  $S = \mathbb{I} + iT = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \int d^4x_1 \cdots d^4x_n \operatorname{T}[\mathcal{H}_1(x_1) \cdots \mathcal{H}_1(x_n)]$  $= \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{i} T^{(n)}, \quad \mathrm{i} T^{(n)} \equiv \frac{(-\mathrm{i})^n}{n!} \int \mathrm{d}^4 x_1 \cdots \mathrm{d}^4 x_n \, \mathsf{T}[\mathcal{H}_1(x_1) \cdots \mathcal{H}_1(x_n)]$ 🐙 这是 iT 在微扰论中的级数展开式,n 是展开式的阶 (order)  $\bigcirc$  在 Yukawa 理论中,第 $_{n}$   $\bigcirc$ 通项 i $T^{(n)}$  的表达式为  $\mathrm{i}T^{(n)} = \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^n}{n!} \int \mathrm{d}^4 x_1 \cdots \mathrm{d}^4 x_n \,\mathsf{T}[\phi(x_1)\bar{\psi}(x_1)\psi(x_1)\cdots\phi(x_n)\bar{\psi}(x_n)\psi(x_n)]$ 🏠 当耦合常数 κ 比较小时,计算最低阶就能够得到比较精确的结果

第7章 Feynman 图

阶 Feynman 图

7.1 节和 7.2 节

#### 应用 Wick 定理

Yukawa 理论

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

ڭ 在 iT 展开式的第 1 阶,即 <mark>κ<sup>1</sup> 阶</mark>,根据 Wick 定理,有

$$\mathrm{i}T^{(1)} = -\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4 x \,\mathsf{T}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] = -\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4 x \,\mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x) + \phi(x)\overline{\bar{\psi}(x)\psi(x)}]$$

 $^2$  阶 Feynman 图

🐜 实标量场  $\phi(x)$  和 Dirac 旋量场  $\psi(x)$  具有不相关的产生湮灭算符

$$\oint \phi(x)\dot{\bar{\psi}}(x) = \phi(x)\dot{\psi}(x) = 0$$

**一非平庸的场缩并只有**  $\phi(x)\overline{\psi}(x)\psi(x)$ 

₩ 注意 (0|N (产生湮灭算符的乘积) |0) = 0

量的产生湮灭算符,使它们刚好能够与场算符一一发生缩并(定义见下文)

#### 粒子态

🧢 引入三种具有确定动量和螺旋度的单粒子态:

 $\mathbf{W}$  Dirac 旋量场  $\psi(x)$  的正费米子态  $\left|\mathbf{p}^{+},\lambda\right\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p},\lambda}^{\dagger} \left|0\right\rangle$ 

 $\mathbf{i}$  Dirac 旋量场  $\psi(x)$  的反费米子态  $\left|\mathbf{p}^{-},\lambda\right\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} b_{\mathbf{p},\lambda}^{\dagger} \left|0\right\rangle$ 

() 实标量场  $\phi(x)$  的玻色子态  $|\mathbf{p}\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} c_{\mathbf{p}}^{\dagger} |0\rangle$ 

 $\swarrow$  为避免混淆,此处将  $\phi(x)$  的产生算符改记为  $c_{1}^{\dagger}$ 

📚 正反粒子不同时,动量的右上角用正号代表正粒子态,负号代表反粒子态

📌 这些右矢可以单独作为 〈ƒ| iT |i〉中的初态 |i〉,相应的左矢可以单独作为末态 〈ƒ|



Yukawa 理论

🧢 引入三种具有确定动量和螺旋度的单粒子态:

◇ Dirac 旋量场 ψ(x) 的正费米子态 |p<sup>+</sup>, λ⟩ = √2E<sub>p</sub> a<sup>†</sup><sub>p,λ</sub> |0⟩
◇ Dirac 旋量场 ψ(x) 的反费米子态 |p<sup>-</sup>, λ⟩ = √2E<sub>p</sub> b<sup>†</sup><sub>p,λ</sub> |0⟩
◇ © 实标量场 φ(x) 的玻色子态 |p⟩ = √2E<sub>p</sub> c<sup>†</sup><sub>p</sub>|0⟩
◇ 为避免混淆,此处将 φ(x) 的产生算符改记为 c<sup>†</sup><sub>p</sub>
◇ た反粒子不同时,动量的右上角用正号代表正粒子态,负号代表反粒子态
✓ 这些右矢可以单独作为 ⟨f| iT |i⟩ 中的初态 |i⟩,相应的左矢可以单独作为末态 ⟨f|
◇ 对真空态作用多个产生算符,就得到包含多个粒子的初态
◇ 比如, |p<sup>+</sup>, λ; q<sup>-</sup>, λ'; k⟩ = √8E<sub>p</sub>E<sub>q</sub>E<sub>k</sub> a<sup>†</sup><sub>p,λ</sub> |0⟩ 描述的初态包含

🍎 1 个动量为  $\mathbf{p}$ 、螺旋度为  $\lambda$  的 Dirac 正费米子  $\psi$ 

🍑 1 个动量为  ${f q}$ 、螺旋度为  $\lambda'$  的 Dirac 反费米子  $ar{\psi}$ 

 $ig \triangleright$  1 个动量为 k 的实标量玻色子  $\phi$ 

 $\bigotimes$  这里用  $\psi$  、 $ar{\psi}$  和  $\phi$  分别作为正费米子、反费米子和实标量玻色子的粒子名称

#### 粒子态

▶ 另一方面,初态  $|\mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle = \sqrt{8E_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{q}}E_{\mathbf{k}}} a^{\dagger}_{\mathbf{p},\lambda} b^{\dagger}_{\mathbf{q},\lambda'} c^{\dagger}_{\mathbf{k}} |0\rangle$  对应的末态是  $\langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | = \sqrt{8E_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{q}}E_{\mathbf{k}}} \langle 0| a_{\mathbf{p},\lambda}b_{\mathbf{q},\lambda'}c_{\mathbf{k}}$ 

🍡 这个末态也包含 🍎 1 个动量为 p 、螺旋度为  $\lambda$  的 Dirac 正费米子  $\psi$ 

🍑 1 个动量为  ${f q}$ 、螺旋度为  $\lambda'$  的 Dirac 反费米子  $ar\psi$ 

ig > 1 个动量为 k 的实标量玻色子  $\phi$ 

於注意,在这两个初末态的表达式中,特意让态矢符号中的动量排列次序与相应产 生湮灭算符的排列次序相同,使得下文在表示场算符与初末态缩并方面比较方便

这种约定与一般的左矢定义不同,使末态记法不同于第二章和第四章中关于双粒子态的记法,对双费米子态实际上相差一个负号,但在振幅模方上不会造成差别

# 场算符与初态的缩并

Yukawa 理论

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

场算符的正能解部分包含湮灭算符,将它作用在具有相应产生算符的初态上可以 给出非零的 c 数,我们将这种作用定义为场算符与初态的缩并

🜓  $\psi(x)$  与正费米子初态的缩并定义为

$$\begin{split} & \left| \mathbf{p}^{+}, \lambda \right\rangle \equiv \psi_{a}^{(+)}(x) \left| \mathbf{p}^{+}, \lambda \right\rangle \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^{3}q}{(2\pi)^{3}} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}}}} \sum_{\lambda'=\pm} u_{a}(\mathbf{q}, \lambda') a_{\mathbf{q},\lambda'} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q \cdot x} \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p},\lambda}^{\dagger} \left| 0 \right\rangle \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^{3}q}{(2\pi)^{3}} \frac{\sqrt{E_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{E_{\mathbf{q}}}} \sum_{\lambda'=\pm} u_{a}(\mathbf{q}, \lambda') \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q \cdot x} \{ a_{\mathbf{q},\lambda'}, a_{\mathbf{p},\lambda}^{\dagger} \} \left| 0 \right\rangle \\ &= \int \mathrm{d}^{3}q \, \frac{\sqrt{E_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{E_{\mathbf{q}}}} \sum_{\lambda'=\pm} u_{a}(\mathbf{q}, \lambda') \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q \cdot x} \delta_{\lambda'\lambda} \delta^{(3)}(\mathbf{q}-\mathbf{p}) \left| 0 \right\rangle = u_{a}(\mathbf{p}, \lambda) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p \cdot x} \left| 0 \right\rangle \end{split}$$

🖌 第四步用到产生湮灭算符的反对易关系

# 场算符与初态的缩并

<u>κ<sup>1</sup></u>阶 Feynman 图

Yukawa 理论

000000000

$$\begin{split} & \bar{\psi}_{a}(x) \left| \mathbf{p}^{-}, \lambda \right\rangle \equiv \bar{\psi}_{a}^{(+)}(x) \left| \mathbf{p}^{-}, \lambda \right\rangle \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^{3}q}{(2\pi)^{3}} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}}}} \sum_{\lambda'=\pm} \bar{v}_{a}(\mathbf{q}, \lambda') \mathbf{b}_{\mathbf{q}, \lambda'} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q \cdot x} \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} \, \mathbf{b}_{\mathbf{p}, \lambda}^{\dagger} |0\rangle = \bar{v}_{a}(\mathbf{p}, \lambda) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p \cdot x} \left| 0 \right\rangle \end{split}$$

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

👂 
$$\phi(x)$$
 与**实标量玻色子初态**的缩并定义为

$$\begin{split} \phi(x) |\mathbf{p}\rangle &\equiv \phi^{(+)}(x) |\mathbf{p}\rangle = \int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}}}} c_{\mathbf{q}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q \cdot x} \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} c_{\mathbf{p}}^{\dagger} |0\rangle \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} \frac{\sqrt{E_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{E_{\mathbf{q}}}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q \cdot x} [c_{\mathbf{q}}, c_{\mathbf{p}}^{\dagger}] |0\rangle = \int \mathrm{d}^3 q \, \frac{\sqrt{E_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{E_{\mathbf{q}}}} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q \cdot x} \delta^{(3)}(\mathbf{q} - \mathbf{p}) |0\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p \cdot x} |0\rangle \end{split}$$

这三种初态缩并均包含正能解因子 e<sup>-ip·x</sup>

### 场算符与末态的缩并

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

00000000

场算符的负能解部分包含产生算符,将它作用在具有相应湮灭算符的末态上可以 给出非零的 c 数,我们将这种作用定义为场算符与末态的缩并

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

🜖  $\bar{\psi}(x)$  与正费米子末态的缩并定义为

$$\begin{split} &\langle \mathbf{p}^+, \lambda \big| \, \overline{\psi}_a(x) \equiv \langle \mathbf{p}^+, \lambda \big| \, \overline{\psi}_a^{(-)}(x) \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} \, \langle 0 \big| \, \sqrt{2E_\mathbf{p}} \, a_{\mathbf{p},\lambda} \frac{1}{\sqrt{2E_\mathbf{q}}} \sum_{\lambda'=\pm} \bar{u}_a(\mathbf{q},\lambda') a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger \mathrm{e}^{\mathrm{i} q \cdot x} \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} \frac{\sqrt{E_\mathbf{p}}}{\sqrt{E_\mathbf{q}}} \sum_{\lambda'=\pm} \bar{u}_a(\mathbf{q},\lambda') \, \langle 0 \big| \, \{a_{\mathbf{p},\lambda}, a_{\mathbf{q},\lambda'}^\dagger\} \mathrm{e}^{\mathrm{i} q \cdot x} = \langle 0 \big| \, \bar{u}_a(\mathbf{p},\lambda) \mathrm{e}^{\mathrm{i} p \cdot x} \end{split}$$

 $ig \psi(x)$ 与反费米子末态的缩并定义为

$$\langle \mathbf{p}^{-}, \lambda | \dot{\psi}_{a}(x) \equiv \langle \mathbf{p}^{-}, \lambda | \psi_{a}^{(-)}(x)$$

$$= \int \frac{\mathrm{d}^{3}q}{(2\pi)^{3}} \langle 0 | \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} b_{\mathbf{p},\lambda} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}}}} \sum_{\lambda'=\pm} v_{a}(\mathbf{q},\lambda') b_{\mathbf{q},\lambda'}^{\dagger} \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\cdot x} = \langle 0 | v_{a}(\mathbf{p},\lambda) \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}$$

7.1 节和 7.2 节

#### 

动量空间 Feynman 规 000000000

### 场算符与末态的缩并

 $\phi(x)$ 与实标量玻色子末态的缩并定义为

$$\begin{split} \langle \mathbf{p} | \phi(x) &\equiv \langle \mathbf{p} | \phi^{(-)}(x) = \int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} \langle 0 | \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} c_{\mathbf{p}} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{q}}}} c_{\mathbf{q}}^{\dagger} \mathrm{e}^{\mathrm{i} q \cdot x} \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^3 q}{(2\pi)^3} \frac{\sqrt{E_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{E_{\mathbf{q}}}} \mathrm{e}^{\mathrm{i} q \cdot x} \langle 0 | [c_{\mathbf{p}}, c_{\mathbf{q}}^{\dagger}] = \int \mathrm{d}^3 q \frac{\sqrt{E_{\mathbf{p}}}}{\sqrt{E_{\mathbf{q}}}} \mathrm{e}^{\mathrm{i} q \cdot x} \langle 0 | \delta^{(3)}(\mathbf{q} - \mathbf{p}) = \langle 0 | \mathrm{e}^{\mathrm{i} p \cdot x} \end{split}$$

💼 这三种末态缩并均包含负能解因子  $\mathrm{e}^{\mathrm{i} p \cdot x}$ 

#### 7.1.1 小节 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

<u><sub>\_ ん</sub>1</u> 阶 Feynman 图

00000000

Yukawa 理论

**万** 将上述  $iT^{(1)}$  分为两项,  $iT^{(1)} = iT_1^{(1)} + iT_2^{(1)}$ , 其中

$$\begin{split} \mathrm{i} T_1^{(1)} &\equiv -\mathrm{i} \kappa \int \mathrm{d}^4 x \, \mathsf{N}[\phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x)] \\ \mathrm{i} T_2^{(1)} &\equiv -\mathrm{i} \kappa \int \mathrm{d}^4 x \, \mathsf{N}[\phi(x) \overline{\bar{\psi}(x)} \psi(x)] \end{split}$$

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

#### 7.1.1 小节 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

**月** 将上述 i $T^{(1)}$  分为两项, i $T^{(1)} = iT_1^{(1)} + iT_2^{(1)}$ , 其中

$$\begin{split} \mathrm{i} T_1^{(1)} &\equiv -\mathrm{i} \kappa \int \mathrm{d}^4 x \, \mathsf{N}[\phi(x) \bar{\psi}(x) \psi(x)] \\ \mathrm{i} T_2^{(1)} &\equiv -\mathrm{i} \kappa \int \mathrm{d}^4 x \, \mathsf{N}[\phi(x) \overline{\bar{\psi}(x)} \psi(x)] \end{split}$$

<sup>2</sup> 阶 Feynman 图

 $\sqrt[4]$  我们先来讨论 i $T_1^{(1)}$ ,要得到非平庸的 T 矩阵元  $\langle f | i T_1^{(1)} | i \rangle$ ,初态和末态中需要 包含 3 个粒子,可列出 8 种情况

**勜** 第 1 种情况中,考虑初态  $|i\rangle = |\mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k}\rangle$  包含 1 对正反费米子和 1 个实标量玻色子,末态  $\langle f | = \langle 0 |$  是真空态,相应的 *T* 矩阵元为

$$\begin{aligned} \langle 0|\,\mathrm{i}T_1^{(1)}\,\big|\mathbf{p}^+,\lambda;\,\mathbf{q}^-,\lambda';\,\mathbf{k}\big\rangle \ &= -\mathrm{i}\kappa\int\mathrm{d}^4x\,\,\langle 0|\,\mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)]\,\big|\mathbf{p}^+,\lambda;\,\mathbf{q}^-,\lambda';\,\mathbf{k}\big\rangle \\ &= -\mathrm{i}\kappa\int\mathrm{d}^4x\,\,\langle 0|\,\phi^{(+)}(x)\bar{\psi}_a^{(+)}(x)\psi_a^{(+)}(x)\,\big|\mathbf{p}^+,\lambda;\,\mathbf{q}^-,\lambda';\,\mathbf{k}\big\rangle \end{aligned}$$

🎌 第二步将场算符分解为正负能解部分,本来应该有 8 项,但只有 1 项贡献非零

余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1 节和 7.2 节

## $iT_1^{(1)}$ **第 1 种情况**

0000000

Yukawa 理论

$$\begin{split} \langle 0|\,\mathrm{i}T_{1}^{(1)}\,|\mathbf{p}^{+},\lambda;\,\mathbf{q}^{-},\lambda';\,\mathbf{k}\rangle &= -\mathrm{i}\kappa\int\mathrm{d}^{4}x\,\,\langle 0|\,\phi^{(+)}(x)\bar{\psi}_{a}^{(+)}(x)\psi_{a}^{(+)}(x)\,|\mathbf{p}^{+},\lambda;\,\mathbf{q}^{-},\lambda';\,\mathbf{k}\rangle\\ &= -\mathrm{i}\kappa\int\mathrm{d}^{4}x\,\,\langle 0|\,\mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi}_{a}(x)\overline{\psi}_{a}(x)]\,|\mathbf{p}^{+},\lambda;\,\mathbf{q}^{-},\lambda';\,\mathbf{k}\rangle\\ &= -\mathrm{i}\kappa\int\mathrm{d}^{4}x\,\,\langle 0|\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x}\bar{v}_{a}(\mathbf{q},\lambda')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\cdot x}u_{a}(\mathbf{p},\lambda)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p\cdot x}\,|0\rangle\\ &= -\mathrm{i}\kappa\int\mathrm{d}^{4}x\,\bar{v}(\mathbf{q},\lambda')u(\mathbf{p},\lambda)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p+q+k)\cdot x}\,\,\langle 0|0\rangle\\ &= -\mathrm{i}\kappa\,\bar{v}(\mathbf{q},\lambda')u(\mathbf{p},\lambda)\,(2\pi)^{4}\delta^{(4)}(p+q+k) \end{split}$$

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

#### Feynman 图

Yukawa 理论



 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

000000

◆ 左边用图形表示  $\langle 0 | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle$  对应的过程

🔚 这种图形化表示称为 Feynman 图

 $^2$  阶 Feynman 图

- 🙆 时间方向自左向右
- 📏 用虚线表示实标量玻色子的运动
- 用带箭头的实线表示 Dirac 费米子的运动
- 🏹 图上用<mark>箭头</mark>标明三个粒子的四维动量 p<sup>µ</sup>、q<sup>µ</sup>和 k<sup>µ</sup>的方向
- 쿦 这只是示意性的,不用精确对应于三维空间中三维动量的实际方向
- 🌂 可以认为这些四维动量的相反数  $-p^{\mu}$ 、 $-q^{\mu}$  和  $-k^{\mu}$  的方向与图上方向**相反**

#### Feynman 图

Yukawa 理论



 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

左边用图形表示  $\langle 0 | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k}$  对应的过程

🔚 这种图形化表示称为 Feynman 图

阶 Feynman 图

- 🙆 时间方向自左向右
- 📏 用虚线表示实标量玻色子的运动

🖌 用带箭头的实线表示 Dirac 费米子的运动

🔀 图上用箭头标明三个粒子的四维动量  $p^{\mu}$ 、 $q^{\mu}$ 和  $k^{\mu}$ 的方向

- 쿦 这只是示意性的,不用精确对应于三维空间中三维动量的实际方向
- 🄪 可以认为这些四维动量的相反数  $-p^{\mu}$ 、 $-q^{\mu}$  和  $-k^{\mu}$  的方向与图上方向**相反**

 於 费米子线上的箭头代表费米子线的方向,可认为是费米子所携带的某种 U(1) 荷 ( $\psi$  和  $\bar{\psi}$ 携带的 U(1) 荷相反) 流动的方向,或者说费米子数流动的方向

- X 对于费米子数守恒的理论,比如这里的 Yukawa 理论,一条连续费米子线只有一个方向,它与正(反)费米子的运动方向相同(相反)
- 正费米子的动量方向与费米子线上的箭头方向相同,反费米子则相反

#### Feynman 图和 Feynman 规则

<u>κ<sup>1</sup> 阶 Feyn</u>man 图

0000000000

Yukawa 理论

- 、 实标量场  $\phi(x)$  描述的玻色子是自身的反粒子,不具有 任何 U(1) 荷,因而不需要在线上标注箭头,即纯中性粒子 的线上没有箭头
- 🔱 正反粒子不同 (即复场) 时,应当在粒子线上标注箭头



阶 Feynman 图

#### Feynman 图和 Feynman 规则

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

00000000

Yukawa 理论

- 、 实标量场  $\phi(x)$  描述的玻色子是自身的反粒子,不具有 任何 U(1) 荷,因而不需要在线上标注箭头,即纯中性粒子 的线上没有箭头
- 🔱 正反粒子不同 (即复场) 时,应当在粒子线上标注箭头
- 💥 三条粒子线相交代表相互作用的发生,称为顶点 (vertex)
- ullet 在顶点附近注明相应的时空坐标,右上图标注了  $x^\mu$
- 🔌 从顶点到初末态粒子的连线称为外线 (external line) ,也称为外腿 (external leg)

阶 Feynman 图

- 👹 右上图包含 1 个顶点和 3 条外线
  - 🎐 Feynman 图清晰地体现了运动情况和相互作用过程
- 🚇 这样的对应关系形成一套 Feynman 规则



# 入射外线 Feynman 规则

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

$$\langle 0 | iT_{1}^{(1)} | \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{q}^{-}, \lambda'; \mathbf{k} \rangle$$
  
=  $-i\kappa \int d^{4}x \langle 0 | \mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi}_{a}(x)\overline{\psi}_{a}(x)] | \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{q}^{-}, \lambda'; \mathbf{k} \rangle$ 

$$= -\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4 x \,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k \cdot x} \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') \mathrm{e}^{-\mathrm{i}q \cdot x} u(\mathbf{p}, \lambda) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p \cdot x}$$

 $\leq$  三条外线分别对应于场算符  $\phi(x)$ 、 $\bar{\psi}(x)$ 、 $\psi(x)$  与初态的 缩并,从而归纳出如下位置空间中的入射外线 Feynman 规则



动量空间 Feynman 规则

$$\psi, \lambda \xrightarrow{p} x = \langle 0 | \psi(x) | \mathbf{p}^{+}, \lambda \rangle = \langle 0 | \psi^{(+)}(x) | \mathbf{p}^{+}, \lambda \rangle = u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i\mathbf{p}\cdot x}$$
  
$$\bar{\psi}, \lambda \xrightarrow{p} x = \langle 0 | \bar{\psi}(x) | \mathbf{p}^{-}, \lambda \rangle = \langle 0 | \bar{\psi}^{(+)}(x) | \mathbf{p}^{-}, \lambda \rangle = \bar{v}(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i\mathbf{p}\cdot x}$$
  
$$\phi \xrightarrow{p} x = \langle 0 | \phi(x) | \mathbf{p} \rangle = \langle 0 | \phi^{(+)}(x) | \mathbf{p} \rangle = e^{-i\mathbf{p}\cdot x}$$

阶 Feynman 图

計 由于正费米子动量方向与线上方向相同,我们可以省略标明动量方向的箭头
 次 反费米子动量方向与线上方向相反,因而将两个箭头都标示出来
 计 也就是说,如果没有标明动量的方向,则它与粒子线上的方向相同
 余钊焕(中山大学)
 第 7章 Feynman 图 7.1 节和 7.2 节
 15 / 78

#### 顶点 Feynman 规则

<u><sup>\_ <sub>ん</sub>1</sub></u>阶 Feynman 图</u></sup>

000000000

Yukawa 理论

$$\langle 0 | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle$$
  
=  $-i\kappa \int d^4x \langle 0 | \mathbf{N}[\phi(x)\overline{\psi_a(x)}\overline{\psi_a(x)}] | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle$   
=  $-i\kappa \int d^4x e^{-ik \cdot x} \overline{v}(\mathbf{q}, \lambda') e^{-iq \cdot x} u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-ip \cdot x}$ 

<u>κ<sup>2</sup></u>阶 Feynman 图



🚉 位置空间中 Yukawa 相互作用的<mark>顶点 Feynman 规则</mark>为



注意,左图从顶点引出来的三条线不 是外线,而是三个"线头",用于连接相 应类型的外线或下文引入的内线

#### 顶点 Feynman 规则

Yukawa 理论

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

$$\langle 0 | iT_1^{(1)} | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle$$
  
=  $-i\kappa \int d^4 x \langle 0 | \mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi_a(x)}\psi_a(x)] | \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} \rangle$   
=  $-i\kappa \int d^4 x e^{-ik \cdot x} \overline{v}(\mathbf{q}, \lambda') e^{-iq \cdot x} u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-ip \cdot x}$ 



动量空间 Feynman 规则

🚉 位置空间中 Yukawa 相互作用的顶点 Feynman 规则为



注意,左图从顶点引出来的三条线不 是外线,而是三个"线头",用于连接相 应类型的外线或下文引入的内线

🏆 现在可以绕过 Wick 定理,从 Feynman 图出发,根据 Feynman 规则直接写出

阶 Feynman 图

$$0|iT_1^{(1)}|\mathbf{p}^+,\lambda;\,\mathbf{q}^-,\lambda';\,\mathbf{k}\rangle = -i\kappa\int \mathrm{d}^4x\,\bar{v}(\mathbf{q},\lambda')u(\mathbf{p},\lambda)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p+q+k)\cdot x}$$

**!!** 在写下费米子的贡献时,应当注意次序,要逆着费米子线上的方向逐项写出来, 这样得到的是数  $\bar{v}(\mathbf{q}, \lambda')u(\mathbf{p}, \lambda)$ ,而非矩阵  $u(\mathbf{p}, \lambda)\bar{v}(\mathbf{q}, \lambda')$ 

余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1节和 7.2节

# $iT_1^{(1)}$ 第 2 种情况

<u><sub>\_ ん</sub>1</u> 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

4 第 2 种情况中,考虑初态  $|i\rangle = |0\rangle$  是真空态,末态  $\langle f| = \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k}|$  包含 1 对正反费米子和 1 个实标量玻色子,相应的 *T* 矩阵元为

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

$$\begin{split} \langle \mathbf{p}^{+}, \lambda; \, \mathbf{q}^{-}, \lambda'; \, \mathbf{k} \big| \, \mathrm{i}T_{1}^{(1)} \, |0\rangle &= -\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^{4}x \, \langle \mathbf{p}^{+}, \lambda; \, \mathbf{q}^{-}, \lambda'; \, \mathbf{k} \big| \, \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] \, |0\rangle \\ &= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^{4}x \, \langle \mathbf{p}^{+}, \lambda; \, \mathbf{q}^{-}, \lambda'; \, \mathbf{k} \big| \, \phi^{(-)}(x)\psi_{a}^{(-)}(x)\bar{\psi}_{a}^{(-)}(x) \, |0\rangle \\ &= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^{4}x \, \langle \mathbf{p}^{+}, \lambda; \, \mathbf{q}^{-}, \lambda'; \, \mathbf{k} \big| \, \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}_{a}(x)\bar{\psi}_{a}(x)] \, |0\rangle \\ &= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^{4}x \, \langle \mathsf{0}| \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}k \cdot x} v_{a}(\mathbf{q}, \lambda') \mathrm{e}^{\mathrm{i}q \cdot x} \bar{u}_{a}(\mathbf{p}, \lambda) \mathrm{e}^{\mathrm{i}p \cdot x} \, |0\rangle \\ &= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^{4}x \, \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') \mathrm{e}^{\mathrm{i}(p+q+k) \cdot x} \\ &= +\mathrm{i}\kappa \, \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') \, (2\pi)^{4} \delta^{(4)}(p+q+k) \end{split}$$

为了让各个场算符依次对末态中相应的粒子进行缩并,第二步交换了两个费米子 场算符的位置,因而带来一个额外的负号,使最前面的符号从负号变为正号

余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1 节和 7.2 节

## <u><sup><sub>ん</sub>1</sub></u>阶 Feynman 图</u></sup> 出射外线 Feynman 规则

0000000

Yukawa 理论

余钊焕

$$\langle \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{q}^{-}, \lambda'; \mathbf{k} | iT_{1}^{(1)} | 0 \rangle$$

$$= +i\kappa \int d^{4}x \langle \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{q}^{-}, \lambda'; \mathbf{k} | \mathbf{N}[\phi(x)\psi_{a}(x)\overline{\psi}_{a}(x)] | 0 \rangle$$

$$= +i\kappa \int d^{4}x \, \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) e^{ip \cdot x} v(\mathbf{q}, \lambda') e^{iq \cdot x} e^{ik \cdot x}$$



动量空间 Feynman 规则

// 归纳得到如下位置空间中的出射外线 Feynman 规则

$$x \bigoplus_{p} \psi, \lambda = \langle \mathbf{p}^{+}, \lambda | \overline{\psi}(x) | 0 \rangle = \langle \mathbf{p}^{+}, \lambda | \overline{\psi}^{(-)}(x) | 0 \rangle = \overline{u}(\mathbf{p}, \lambda) e^{ip \cdot x}$$

$$x \bigoplus_{p} \overline{\psi}, \lambda = \langle \mathbf{p}^{-}, \lambda | \overline{\psi}(x) | 0 \rangle = \langle \mathbf{p}^{-}, \lambda | \psi^{(-)}(x) | 0 \rangle = v(\mathbf{p}, \lambda) e^{ip \cdot x}$$

$$x \bigoplus_{p} \overline{\psi}, \lambda = \langle \mathbf{p}^{-}, \lambda | \overline{\psi}(x) | 0 \rangle = \langle \mathbf{p}^{-}, \lambda | \psi^{(-)}(x) | 0 \rangle = v(\mathbf{p}, \lambda) e^{ip \cdot x}$$

 $^2$  阶 Feynman 图

 $\mathbf{b}$  初末态粒子满足质壳条件  $p^2=E_{\mathbf{p}}^2-|\mathbf{p}|^2=m^2$ ,而且能量  $E_{\mathbf{p}}>0$ ,属于在壳 (on-shell) 粒子

入射外线联系着初态粒子,出射外线联系着末态粒子,外线上的动量是在壳的

(中山大学) 第7章

Feynman 图 7.1 节和 7.2 节

#### 额外负号

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论



 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

#### 额外负号

Yukawa 理论

前面提到,由于计算中交换了两个费米子场算符的位置,最前面的符号由负变正 🌈 此时顶点 Feynman 规则仍然适用,但需考虑交换费米子场算符带来的额外负号 T 矩阵元是概率振幅,它的模方才联系着观测量 🡉 整体符号不影响观测量 🔗 如果一个过程存在多个概率振幅,则振幅之间的相对符号会影响观测量  $\langle \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{q}^{-}, \lambda'; \mathbf{k} | iT_{1}^{(1)} | 0 \rangle = -i\kappa \int d^{4}x \langle \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{q}^{-}, \lambda'; \mathbf{k} | \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | 0 \rangle$  $= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4x \left< \mathbf{\dot{p}^+}, \lambda; \mathbf{\dot{q}^-}, \lambda'; \mathbf{\dot{k}} \right| \mathsf{N}[\phi(x)\psi_a(x)\bar{\psi}_a(x)] \left| 0 \right>$  $= -\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4x \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | 0 \rangle$ 

阶 Feynman 图

间 Feynman 规则

#### 额外负号

Yukawa 理论

前面提到,由于计算中交换了两个费米子场算符的位置,最前面的符号由负变正 🌈 此时顶点 Feynman 规则仍然适用,但需考虑交换费米子场算符带来的额外负号 T 矩阵元是概率振幅,它的模方才联系着观测量 🡉 整体符号不影响观测量 🔗 如果一个过程存在多个概率振幅,则振幅之间的相对符号会影响观测量  $\left\langle \mathbf{p}^{+},\lambda;\,\mathbf{q}^{-},\lambda';\,\mathbf{k}\right|\mathrm{i}T_{1}^{(1)}\left|0\right\rangle \,=\,-\mathrm{i}\kappa\,\int\mathrm{d}^{4}x\,\left\langle \mathbf{p}^{+},\lambda;\,\mathbf{q}^{-},\lambda';\,\mathbf{k}\right|\,\mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)]\left|0\right\rangle$  $= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4 x \, \left\langle \stackrel{|}{\mathbf{p}^+}, \lambda; \stackrel{|}{\mathbf{q}^-}, \lambda'; \stackrel{|}{\mathbf{k}} \right| \mathbb{N}[\phi(x)\psi_a(x)\psi_a(x)] |0\rangle$  $= -\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4x \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | 0 \rangle$ 

Feynman 🖉

余钊焕 (中山大学)

第 7 章 Feynman 图 7.1 节和 7.2 节

Feynman 规则

# T 矩阵元的缩并规律

Yukawa 理论

余钊焕

(中山大学)

<sub>座</sub>1 阶 Feynman 图

 $^2$  阶 Fevnman 图

熟悉这个规律后,可在正规乘积期待值上直接添加缩并线,调换场算符解开纠缠的缩并线,确定振幅符号,再往下计算;这样就跳过了用正负能解表达的中间步骤

$$\left\langle \mathbf{p}^{+}, \lambda; \, \mathbf{q}^{-}, \lambda'; \, \mathbf{k} \right| \mathrm{i}T_{1}^{(1)} \left| 0 \right\rangle = -\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^{4}x \, \left\langle \mathbf{p}^{+}, \lambda; \, \mathbf{q}^{-}, \lambda'; \, \mathbf{k} \right| \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] \left| 0 \right\rangle$$

$$= -i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(x)] | 0 \rangle$$
  
$$= +i\kappa \int d^4x \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k} | \mathsf{N}[\phi(x)\psi_a(x)\bar{\psi}_a(x)] | 0 \rangle$$

7.1 节和 7.2 节

$$= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4 x \,\bar{u}(\mathbf{p},\lambda) v(\mathbf{q},\lambda') \mathrm{e}^{\mathrm{i}(p+q+k)\cdot x}$$

这样一个 T 矩阵元的缩并规律是普遍的,接下来的计算会不断地验证它
 《 》 后面我们将利用这个规律确定多个振幅之间的相对符号

Feynman 图

第7章

20 / 78

# iT<sub>1</sub><sup>(1)</sup> 第 3 种情况

<sub>成</sub>1 阶 Feynman

Yukawa 理论

余钊焕

(中山大学)

上述 Feynman 规则适用于各种情况,比如与  $iT_1^{(1)}$  相关的余下 6 种情况 顶点规则只有一种形式,适用于各种不同的时间方向和动量方向 🐂 第 3 种情况中,考虑初态 |i〉 = |k〉 包含 1 个实标量玻色子, 末态  $\langle f | = \langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda' |$  包含 1 对正反费米子,相应的 *T* 矩阵元为  $\langle \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{q}^{-}, \lambda' | iT_{1}^{(1)} | \mathbf{k} \rangle = -i\kappa \int d^{4}x \langle \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{q}^{-}, \lambda' | \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | \mathbf{k} \rangle$  $= +i\kappa \int d^4x \left\langle \mathbf{p}^+, \lambda; \, \mathbf{q}^-, \lambda' \right| \psi_a^{(-)}(x) \bar{\psi}_a^{(-)}(x) \phi^{(+)}(x) \left| \mathbf{k} \right\rangle$  $\bar{\psi}, \lambda'$  $= +i\kappa \int d^4x \left\langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda' \right| \mathbf{N}[\psi_a(x) \overline{\psi}_a(x) \overline{\psi}(x)] | \mathbf{k} \rangle$  $= +i\kappa \int d^4x \, v_a(\mathbf{q}, \lambda') \bar{u}_a(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i(k-p-q) \cdot x}$  $= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4 x \,\bar{u}(\mathbf{p},\lambda) v(\mathbf{q},\lambda') \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k-p-q)\cdot x}$  $\psi, \lambda$  $= +i\kappa \bar{u}(\mathbf{p},\lambda)v(\mathbf{q},\lambda')(2\pi)^4 \delta^{(4)}(k-p-q)$  $= -i\kappa \int d^4x \left\langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda' \right| \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | \mathbf{k} \right\rangle$ 

阶 Feynman 图

间 Feynman 规则

# $iT_1^{(1)}$ 第 4 种情况

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

余钊焕

(中山大学)

 第 4 种情况中,考虑初态  $|i\rangle = |\mathbf{p}^+, \lambda\rangle$  包含 1 个正费米子, 末态  $\langle f| = \langle \mathbf{q}^+, \lambda'; \mathbf{k}|$  包含 1 个正费米子和 1 个实标量玻色子,相应的 T 矩阵元为

$$\langle \mathbf{q}^{+}, \lambda'; \mathbf{k} | iT_{1}^{(1)} | \mathbf{p}^{+}, \lambda \rangle = -i\kappa \int d^{4}x \langle \mathbf{q}^{+}, \lambda'; \mathbf{k} | \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | \mathbf{p}^{+}, \lambda \rangle$$

$$\phi = -i\kappa \int d^{4}x \langle \mathbf{q}^{+}, \lambda'; \mathbf{k} | \phi^{(-)}(x)\bar{\psi}^{(-)}(x)\psi^{(+)}(x) | \mathbf{p}^{+}, \lambda \rangle$$

$$= -i\kappa \int d^{4}x \langle \mathbf{q}^{+}, \lambda'; \mathbf{k} | \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | \mathbf{p}^{+}, \lambda \rangle$$

$$= -i\kappa \int d^{4}x \bar{u}(\mathbf{q}, \lambda')u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i(\mathbf{p}-\mathbf{q}-k)\cdot x}$$

$$= -i\kappa \bar{u}(\mathbf{q}, \lambda')u(\mathbf{p}, \lambda) (2\pi)^{4}\delta^{(4)}(p-q-k)$$

# ${ m i}T_1^{(1)}$ 第 5 种情况

<u><sup>\_ <sub>ん</sub>1</sub></u>阶 Feynman 图</u></sup>

Yukawa 理论

余钊焕

(中山大学)

 第 5 种情况中,考虑初态  $|i\rangle = |\mathbf{p}^-, \lambda\rangle$  包含 1 个反费米子, 末态  $\langle f| = \langle \mathbf{q}^-, \lambda'; \mathbf{k}|$  包含 1 个反费米子和 1 个实标量玻色子,相应的 *T* 矩阵元为

# $iT_1^{(1)}$ 第 6 种情况

<sup>κ1</sup>阶 Feynman 图

Yukawa 理论

余钊焕

(中山大学)

 $\langle \mathbf{m} \rangle$  第 6 种情况中,考虑初态  $|i\rangle = |\mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda'\rangle$  包含 1 对正反费米子, 末态  $\langle f| = \langle \mathbf{k}|$  包含 1 个实标量玻色子,相应的 *T* 矩阵元为

$$\langle \mathbf{k} | iT_{1}^{(1)} | \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{q}^{-}, \lambda' \rangle = -i\kappa \int d^{4}x \ \langle \mathbf{k} | \ \mathbf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{q}^{-}, \lambda' \rangle$$

$$= -i\kappa \int d^{4}x \ \langle \mathbf{k} | \ \phi^{(-)}(x)\bar{\psi}^{(+)}(x)\psi^{(+)}(x) | \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{q}^{-}, \lambda' \rangle$$

$$= -i\kappa \int d^{4}x \ \langle \mathbf{k} | \ \mathbf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(x)] | \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{q}^{-}, \lambda' \rangle$$

$$= -i\kappa \int d^{4}x \ \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda')u(\mathbf{p}, \lambda)e^{-i(p+q-k)\cdot x}$$

$$= -i\kappa \ \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda')u(\mathbf{p}, \lambda) (2\pi)^{4}\delta^{(4)}(p+q-k)$$

# $iT_1^{(1)}$ 第 7 种情况

<u><sup>\_ <sub>ん</sub>1</sub></u>阶 Feynman 图</u></sup>

Yukawa 理论

U

余钊焕

(中山大学)

5册 第 7 种情况中,考虑初态  $|i\rangle = |\mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{k}\rangle$  包含 1 个正费米子和 1 个实标量玻色 子,末态  $\langle f| = \langle \mathbf{q}^+, \lambda' |$  包含 1 个正费米子,相应的 *T* 矩阵元为

$$\langle \mathbf{q}^{+}, \lambda' | iT_{1}^{(1)} | \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{k} \rangle = -i\kappa \int d^{4}x \langle \mathbf{q}^{+}, \lambda' | \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{k} \rangle$$

$$= -i\kappa \int d^{4}x \langle \mathbf{q}^{+}, \lambda' | \bar{\psi}_{a}^{(-)}(x)\phi^{(+)}(x)\psi_{a}^{(+)}(x) | \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{k} \rangle$$

$$= -i\kappa \int d^{4}x \langle \mathbf{q}^{+}, \lambda' | \mathsf{N}[\bar{\psi}_{a}(x)\phi(x)\bar{\psi}_{a}(x)] | \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{k} \rangle$$

$$= -i\kappa \int d^{4}x \bar{u}(\mathbf{q}, \lambda')u(\mathbf{p}, \lambda) e^{-i(p+k-q)\cdot x}$$

$$= -i\kappa \bar{u}(\mathbf{q}, \lambda')u(\mathbf{p}, \lambda) (2\pi)^{4}\delta^{(4)}(p+k-q)$$

$$= -i\kappa \int d^{4}x \langle \mathbf{q}^{+}, \lambda' | \mathsf{N}[\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(x)] | \mathbf{p}^{+}, \lambda; \mathbf{k} \rangle$$

# $iT_1^{(1)}$ 第 8 种情况

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

U

余钊焕

(中山大学)

**3** 第 8 种情况中,考虑初态  $|i\rangle = |\mathbf{p}^-, \lambda; \mathbf{k}\rangle$  包含 1 个反费米子和 1 个实标量玻色 子,末态  $\langle f| = \langle \mathbf{q}^-, \lambda' |$  包含 1 个反费米子,相应的 *T* 矩阵元为

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

$$\begin{split} \langle \mathbf{q}^{-}, \lambda' | \, \mathrm{i}T_{1}^{(1)} | \mathbf{p}^{-}, \lambda; \, \mathbf{k} \rangle &= -\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^{4}x \, \langle \mathbf{q}^{-}, \lambda' | \, \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)] | \mathbf{p}^{-}, \lambda; \, \mathbf{k} \rangle \\ &= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^{4}x \, \langle \mathbf{q}^{-}, \lambda' | \, \psi_{a}^{(-)}(x)\phi^{(+)}(x)\bar{\psi}_{a}^{(+)}(x) | \mathbf{p}^{-}, \lambda; \, \mathbf{k} \rangle \\ \phi &= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^{4}x \, \langle \mathbf{q}^{-}, \lambda' | \, \mathsf{N}[\psi_{a}(x)\phi^{(x)}\bar{\psi}_{a}(x)] | \mathbf{p}^{-}, \lambda; \, \mathbf{k} \rangle \\ &= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^{4}x \, v_{a}(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}_{a}(\mathbf{p}, \lambda) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p+k-q)\cdot x} \\ &= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^{4}x \, \bar{v}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p+k-q)\cdot x} \\ &= +\mathrm{i}\kappa \, \bar{v}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') (2\pi)^{4} \delta^{(4)}(p+k-q) \\ &= -\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^{4}x \, \langle \mathbf{q}^{-}, \lambda' | \, \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(x)] | \mathbf{p}^{-}, \lambda; \, \mathbf{k} \rangle \end{split}$$

26 / 78
## 内线 Feynman 规则

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

業 接下来讨论 i
$$T_2^{(1)} = -i\kappa \int d^4x \, \mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi(x)}\psi(x)]$$

 ${m 2}$   ${
m i} T_2^{(1)}$  包含两个场算符之间的缩并,也就是 6.4 节讨论的 Feynman 传播子

🖀 将 Dirac 旋量场和实标量场 Feynman 传播子在位置空间中的 Feynman 规则设为

阶 Feynman 图

$$x \xrightarrow{p} y = \psi(y)\overline{\psi}(x) = S_{\mathrm{F}}(y-x) = \int \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4} \frac{\mathrm{i}(\not p + m_{\psi})}{p^2 - m_{\psi}^2 + \mathrm{i}\epsilon} e^{-\mathrm{i}p \cdot (y-x)}$$
$$x \xrightarrow{p} y = \overline{\phi(y)\phi(x)} = D_{\mathrm{F}}(y-x) = \int \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4} \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m_{\psi}^2 + \mathrm{i}\epsilon} e^{-\mathrm{i}p \cdot (y-x)}$$

 $igstype m_\psi$  是  $oldsymbol{\psi}$  粒子质量, $m_\phi$  是  $oldsymbol{\phi}$  粒子质量

➢ 在位置空间中,Feynman 传播子是粒子从 ∞ 处顶点传播到 y 处顶点的振幅,我 们用一条连接两个顶点的粒子线表示,这样的线称为内线 (internal line)

🛵 Dirac 费米子的 Feynman 传播子用<mark>带箭头的实线</mark>表示,动量方向与箭头方向一致

🛴 标量玻色子的 Feynman 传播子用<mark>虚线</mark>表示,动量方向另外标明

余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1 节和 7.2 节

#### 虚粒子与实粒子

 $\kappa^1$  阶 Feynman 图

Yukawa 理论

$$x \bullet p = \overline{\psi(y)}\overline{\psi}(x) = S_{\rm F}(y-x) = \int \frac{{\rm d}^4 p}{(2\pi)^4} \frac{{\rm i}(p+m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + {\rm i}\epsilon} \,{\rm e}^{-{\rm i}p \cdot (y-x)}$$

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

$$x \bullet - - \bullet y = \phi(y)\phi(x) = D_{\mathrm{F}}(y-x) = \int \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4} \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m_{\phi}^2 + \mathrm{i}\epsilon} e^{-\mathrm{i}p \cdot (y-x)}$$

#### 虚粒子与实粒子

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

$$x \bullet p = \overline{\psi(y)}\overline{\psi}(x) = S_{\rm F}(y-x) = \int \frac{{\rm d}^4 p}{(2\pi)^4} \frac{{\rm i}(p+m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + {\rm i}\epsilon} \,{\rm e}^{-{\rm i}p \cdot (y-x)}$$

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

$$x \bullet - - \bullet y = \phi(y)\phi(x) = D_{\mathrm{F}}(y-x) = \int \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4} \frac{\mathrm{i}}{p^2 - m_{\phi}^2 + \mathrm{i}\epsilon} e^{-\mathrm{i}p \cdot (y-x)}$$

☞ 用内线表示的粒子称为虚粒子 (virtual particle),描述场的传播行为

📁 虚粒子可以是<mark>在壳粒子</mark>,也可以是离壳粒子

🚀 反过来,用外线表示的粒子称为实粒子 (real particle) ,它一定是<mark>在壳粒子</mark>

# $iT_2^{(1)}$ 第1种情况

<u><sup>\_ <sub>死</sub>1</sup> 阶 Feyn</u>man 图

Yukawa 理

igcup i $T_2^{(1)}$  剩下一个标量场  $\phi(x)$  未参与缩并,我们可以让它与初态或末态缩并 🍷 考虑初态 |i〉 = |k〉 包含 1 个实标量玻色子,末态 〈ƒ| = 〈0| 是真空态,有  $\langle 0 | iT_2^{(1)} | \mathbf{k} \rangle$  $= -\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4 x \, \langle 0| \, \mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi(x)}\psi(x)] \, |\mathbf{k}\rangle = -\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4 x \, \langle 0| \, \overline{\psi_a(x)}\psi_a(x)\phi^{(+)}(x) \, |\mathbf{k}\rangle$  $= -\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4 x \, \langle 0 | \, \mathsf{N}[\bar{\psi_a(x)}\psi_a(x)\phi(x)] \, | \mathbf{k} \rangle \\ = +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4 x \, \langle 0 | \, \mathsf{N}[\bar{\psi_a(x)}\bar{\psi_a(x)}\phi(x)] \, | \mathbf{k} \rangle$  $= +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4 x \, S_{\mathrm{F},aa}(x-x) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k \cdot x} = +\mathrm{i}\kappa \int \mathrm{d}^4 x \, \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k \cdot x} \operatorname{tr}[S_{\mathrm{F}}(0)]$  $= +i\kappa (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k) \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i \operatorname{tr}(\not\!\!\!/ + m_\psi)}{p^2 - m_{\perp}^2 + i\epsilon} = -i\kappa \int d^4x \left\langle 0 \right| \mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi(x)}\psi(x)] \left| \mathbf{k} \right\rangle$ 

第四步交换了正规乘积中两个费米子场算符的次序
 以符合 Feynman 传播子的形式,带来一个额外的负号
 第六步用到矩阵的迹的定义 tr[S<sub>F</sub>(0)] = S<sub>F,aa</sub>(0)



余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1节和 7.2节

29 / 78

#### 

$$\langle 0| iT_2^{(1)} |\mathbf{k}\rangle = -i\kappa \int d^4x \ \langle 0| \, \mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi}(x)\overline{\psi}(x)] |\mathbf{k}\rangle$$

$$= +i\kappa \int d^4x \ \langle 0| \, \mathsf{N}[\overline{\psi}_a(x)\overline{\psi}_a(x)\overline{\phi}(x)] |\mathbf{k}\rangle$$

$$= +i\kappa \int d^4x \ S_{\mathbf{F},aa}(0) \mathrm{e}^{-ik \cdot x} = +i\kappa \ (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k) \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{\mathrm{i}\operatorname{tr}(\not\!\!p + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i}\epsilon}$$

 $\overset{>}{\sim}$  i $T_2^{(1)}$  中参与缩并的费米子场算符  $\psi(x)$  和  $\bar{\psi}(x)$  具有相同的时空坐标 x,因而 Feynman 传播子从 x 处的顶点出发,传播回到 x 处的顶点,形成一个<mark>封闭的圈</mark>

p

#### 圈图与树图

Yukawa 理论

$$\begin{array}{l} \langle 0|\,\mathrm{i}T_2^{(1)}\,|\mathbf{k}\rangle \,=\, -\mathrm{i}\kappa\int\mathrm{d}^4x\,\,\langle 0|\,\mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)]\,|\mathbf{k}\rangle \\ &=\, +\mathrm{i}\kappa\int\mathrm{d}^4x\,\,\langle 0|\,\mathsf{N}[\psi_a(x)\bar{\psi}_a(x)\phi(x)]\,|\mathbf{k}\rangle \\ &=\, +\mathrm{i}\kappa\int\mathrm{d}^4x\,S_{\mathrm{F},aa}(0)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot x} = +\mathrm{i}\kappa\,(2\pi)^4\delta^{(4)}(k)\int\frac{\mathrm{d}^4p}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{i}\,\mathrm{tr}(\not\!\!p+m_\psi)}{p^2-m_\psi^2+\mathrm{i}\epsilon} \\ &\stackrel{}{\circlearrowright}\,\mathrm{i}T_2^{(1)}\,\,\mathrm{p}$$
与缩并的费米子场算符  $\psi(x)$ 和  $\bar{\psi}(x)$ 具有相同的时空坐标  $x$ ,因而

Feynman 传播子从 x 处的顶点出发,传播回到 x 处的顶点,形成一个封闭的圈

🌲 相反地,不包含圈结构的 Feynman 图称为<mark>树图</mark> (tree diagram)

 ${\ 
ightarrow 
ight$ 

🛞 圈图里出现一个**未定**的四维动量  $p^{\mu}$ ,称为<mark>圈动量</mark> (loop momentum),它的取值不 能通过初末态四维动量确定,而是通过<mark>积分  $\int d^4 p/(2\pi)^4$ </mark> 考虑**所有取值** 

💘 一个<mark>封闭的费米子圈</mark>贡献一个额外的负号,且需要对 Dirac 矩阵 (或其乘积) 求迹

 $\boldsymbol{n}$ 

# iT<sub>2</sub><sup>(1)</sup> **第 2 种情况**

<u><sup>\_ <sub>ん</sub>1</sub></u>阶 Feynman 图</u></sup>

Yukawa 理论

Y 在  $iT_2^{(1)}$  的另一种情况中,考虑初态  $|i\rangle = |0\rangle$  是真空态,末态  $\langle f| = \langle \mathbf{k}|$  包含 1 个实标量玻色子,相应的 T 矩阵元为

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

$$\begin{split} \langle \mathbf{k} | iT_2^{(1)} | 0 \rangle &= -i\kappa \int d^4 x \ \langle \mathbf{k} | \ \mathbf{N}[\phi(x)\overline{\psi}(x)\overline{\psi}(x)] | 0 \rangle \\ &= -i\kappa \int d^4 x \ \langle \mathbf{k} | \ \phi^{(-)}(x)\overline{\psi}_a(x)\overline{\psi}_a(x) | 0 \rangle \\ &= -i\kappa \int d^4 x \ \langle \mathbf{k} | \ \mathbf{N}[\phi(x)\overline{\psi}_a(x)\overline{\psi}_a(x)] | 0 \rangle = +i\kappa \int d^4 x \ \langle \mathbf{k} | \ \mathbf{N}[\phi(x)\overline{\psi}_a(x)\overline{\psi}_a(x)] | 0 \rangle \\ &= +i\kappa \int d^4 x \ e^{\mathbf{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} S_{\mathbf{F},aa}(x-x) = +i\kappa \int d^4 x \ e^{\mathbf{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \operatorname{tr}[S_{\mathbf{F}}(0)] \\ &= +i\kappa \left(2\pi\right)^4 \delta^{(4)}(k) \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{\mathrm{i}\operatorname{tr}(\not p + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i}\epsilon} \end{split}$$

🎈 像以上两幅 Feynamn 图一样只包含一条外线的图称为蝌蚪图 (tadpole diagram)

余钊焕(中山大学)

#### 动力学与运动学

#### 🌃 以上列举的 10 个 Feynman 图对应于 10 个动力学允许的过程

但是,其中大多数过程在运动学上并不允许,因为初态和末态不能同时满足能量和动量守恒定律,也就是说,不能满足运动学条件

#### 动力学与运动学

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

III 以上列举的 10 个 Feynman 图对应于 10 个动力学允许的过程

 但是,其中大多数过程在运动学上并不允许,因为初态和末态不能同时满足能量
 和动量守恒定律,也就是说,不能满足运动学条件

 <u>ハ</u> 当  $m_{\phi} > 2m_{\psi}$  时,有 2 个过程是例外的,运动学允许它们发生

 第一个过程是一个  $\phi$  粒子衰变成一对正反  $\psi$  粒子的过程  $\phi \to \psi \bar{\psi}$  

 第二个过程是一对正反  $\psi$  粒子融合 (fusion) 成一个  $\phi$  粒子的过程  $\psi \bar{\psi} \to \phi$ 

阶 Feynman 图

00000



#### $\phi ightarrow \psi ar{\psi}$ 衰变过程

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

余钊焕

(中山大学)

**翻** 现在计算  $\phi \rightarrow \psi \bar{\psi}$  衰变过程对应的衰变宽度 物 根据  $\langle f | iT | i \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) i\mathcal{M}$ ,将  $\langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda' | iT_1^{(1)} | \mathbf{k} \rangle$  $= i\kappa \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k - p - q)$ 

笛7音

中的  $\delta$  函数因子  $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(k-p-q)$  扔掉,就得到  $\phi \to \psi \bar{\psi}$  衰变过程的不变振幅  $i\mathcal{M} = i\kappa \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda)v(\mathbf{q}, \lambda')$ 

Feynman 图

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图



7.1 节和 7.2 节

动量空间 Feynman 规则

 $\bar{\psi}, \lambda'$ 

 $\psi, \lambda$ 

## $\phi \rightarrow \psi \psi$ 衰变过程

Yukawa 理论

 $\overline{\mathbf{m}}$ 现在计算  $\phi \rightarrow \psi \overline{\psi}$  衰变过程对应的衰变宽度 物 根据  $\langle f | iT | i \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)} (p_i - p_f) i\mathcal{M}$ ,将  $\langle \mathbf{p}^+, \lambda; \mathbf{q}^-, \lambda' | iT_1^{(1)} | \mathbf{k} \rangle$  $= i\kappa \bar{u}(\mathbf{p},\lambda)v(\mathbf{q},\lambda')(2\pi)^4 \delta^{(4)}(k-p-q)$ 中的  $\delta$  函数因子  $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(k-p-q)$  扔掉, 就得到  $\phi \to \psi \bar{\psi}$  衰变过程的不变振幅

00000000000

 $i\mathcal{M} = i\kappa \bar{u}(\mathbf{p},\lambda)v(\mathbf{q},\lambda')$ 

阶 Feynman 图

 $\mathbf{I}$  这是  $\kappa^1$  阶的结果,它是贡献到这个过程的最低阶,即领头阶 (leading order) 🐔 当 Yukawa 耦合常数 κ 比较小时,领头阶的贡献远大于更高阶的贡献 🦏 对 i M 取复共轭 (等同于厄米共轭),得

 $(i\mathcal{M})^* = [i\kappa u^{\dagger}(\mathbf{p},\lambda)\gamma^0 v(\mathbf{q},\lambda')]^{\dagger} = -i\kappa v^{\dagger}(\mathbf{q},\lambda')\gamma^0 u(\mathbf{p},\lambda) = -i\kappa \bar{v}(\mathbf{q},\lambda')u(\mathbf{p},\lambda)$ 

**警 不变振幅的模方是**  $|\mathcal{M}|^2 = \kappa^2 \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda)$ 

动量空间 Feynman 规则

 $\bar{\psi}, \lambda'$ 

 $\psi$ .  $\lambda$ 

#### Casimir 技巧

Yukawa 理论

#### 🐂 不变振幅模方进一步化为

$$\begin{aligned} |\mathcal{M}|^2 &= \kappa^2 \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda) = \kappa^2 \bar{u}_a(\mathbf{p}, \lambda) v_a(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}_b(\mathbf{q}, \lambda') u_b(\mathbf{p}, \lambda) \\ &= \kappa^2 u_b(\mathbf{p}, \lambda) \bar{u}_a(\mathbf{p}, \lambda) v_a(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}_b(\mathbf{q}, \lambda') = \kappa^2 \operatorname{tr}[u(\mathbf{p}, \lambda) \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda')] \end{aligned}$$

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

(本)  $u_b(\mathbf{p},\lambda)\bar{u}_a(\mathbf{p},\lambda)$  和  $v_a(\mathbf{q},\lambda')\bar{v}_b(\mathbf{q},\lambda')$  是矩阵  $u(\mathbf{p},\lambda)\bar{u}(\mathbf{p},\lambda)$  和  $v(\mathbf{q},\lambda')\bar{v}(\mathbf{q},\lambda')$  的 ba 分量和 ab 分量,对 a 求和表示矩阵相乘,对 b 求和表示求迹

#### Casimir 技巧

Yukawa 理论

#### 🐂 不变振幅模方进一步化为

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

$$\begin{aligned} |\mathcal{M}|^2 &= \kappa^2 \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda') u(\mathbf{p}, \lambda) = \kappa^2 \bar{u}_a(\mathbf{p}, \lambda) v_a(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}_b(\mathbf{q}, \lambda') u_b(\mathbf{p}, \lambda) \\ &= \kappa^2 u_b(\mathbf{p}, \lambda) \bar{u}_a(\mathbf{p}, \lambda) v_a(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}_b(\mathbf{q}, \lambda') = \kappa^2 \operatorname{tr}[u(\mathbf{p}, \lambda) \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) v(\mathbf{q}, \lambda') \bar{v}(\mathbf{q}, \lambda')] \end{aligned}$$

 $^2$  阶 Fevnman 图

(本)  $u_b(\mathbf{p},\lambda)\bar{u}_a(\mathbf{p},\lambda)$  和  $v_a(\mathbf{q},\lambda')\bar{v}_b(\mathbf{q},\lambda')$  是矩阵  $u(\mathbf{p},\lambda)\bar{u}(\mathbf{p},\lambda)$  和  $v(\mathbf{q},\lambda')\bar{v}(\mathbf{q},\lambda')$  的 ba 分量和 ab 分量,对 a 求和表示矩阵相乘,对 b 求和表示求迹

第 在计算 φ 的衰变宽度时,应当包含所有可能的未态,即包括所有可能的动量取值 和螺旋态,因此需要使用对未态粒子螺旋度求和的非极化不变振幅模方

😻 这种把旋量计算转化为求迹运算的方法称为 **Casimir 技巧** (Casimir's trick)

余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1 节和 7.2 节

#### 求迹运算

Yukawa 理论

 
知在需要对 Dirac 矩阵及其乘积求迹 常 根据  $(\gamma^5)^2 = 1$ 、  $\gamma^{\mu}\gamma^5 = -\gamma^5\gamma^{\mu}$  和矩阵乘积之迹的性质  $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ , 有  $\operatorname{tr}(\gamma^{\mu}) = \operatorname{tr}(\gamma^{\mu}\gamma^5\gamma^5) = -\operatorname{tr}(\gamma^5\gamma^{\mu}\gamma^5) = -\operatorname{tr}(\gamma^5\gamma^5\gamma^{\mu}) = -\operatorname{tr}(\gamma^{\mu})$  $\operatorname{tr}(\gamma^{\mu}) = 0$ 

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

$$\checkmark \operatorname{tr}(p) = \operatorname{tr}(p_{\mu}\gamma^{\mu}) = p_{\mu}\operatorname{tr}(\gamma^{\mu}) = 0$$

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

#### 求迹运算

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

🐚 现在需要对 Dirac 矩阵及其乘积求迹  $\mathbf{k}$  根据  $(\gamma^5)^2 = 1$ 、 $\gamma^{\mu}\gamma^5 = -\gamma^5\gamma^{\mu}$  和矩阵乘积之迹的性质 tr(AB) = tr(BA), 有  $\operatorname{tr}(\gamma^{\mu}) = \operatorname{tr}(\gamma^{\mu}\gamma^{5}\gamma^{5}) = -\operatorname{tr}(\gamma^{5}\gamma^{\mu}\gamma^{5}) = -\operatorname{tr}(\gamma^{5}\gamma^{5}\gamma^{\mu}) = -\operatorname{tr}(\gamma^{\mu})$  $\operatorname{tr}(\gamma^{\mu}) = 0$  $\checkmark \operatorname{tr}(p) = \operatorname{tr}(p_{\mu}\gamma^{\mu}) = p_{\mu}\operatorname{tr}(\gamma^{\mu}) = 0$  $\mathbf{M}$  由于  $\gamma^{\mu}\gamma^{\nu} = 2a^{\mu\nu} - \gamma^{\nu}\gamma^{\mu}$ ,两个 Dirac 矩阵乘积之迹满足  $\operatorname{tr}(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}) = \operatorname{tr}(2q^{\mu\nu} - \gamma^{\nu}\gamma^{\mu}) = 2q^{\mu\nu}\operatorname{tr}(1) - \operatorname{tr}(\gamma^{\nu}\gamma^{\mu}) = 8q^{\mu\nu} - \operatorname{tr}(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu})$  $\operatorname{tr}(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}) = 4g^{\mu\nu}$  $= \operatorname{tr}(pq) = p_{\mu}q_{\nu}\operatorname{tr}(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}) = 4p_{\mu}q_{\nu}q^{\mu\nu} = 4p \cdot q$ 

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

#### 求迹运算

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

<u>\_\_\_\_\_</u>

Yukawa 理论

🐚 现在需要对 Dirac 矩阵及其乘积求迹  $\mathbf{k}$  根据  $(\gamma^5)^2 = 1$ 、 $\gamma^{\mu}\gamma^5 = -\gamma^5\gamma^{\mu}$  和矩阵乘积之迹的性质  $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ ,有  $\operatorname{tr}(\gamma^{\mu}) = \operatorname{tr}(\gamma^{\mu}\gamma^{5}\gamma^{5}) = -\operatorname{tr}(\gamma^{5}\gamma^{\mu}\gamma^{5}) = -\operatorname{tr}(\gamma^{5}\gamma^{5}\gamma^{\mu}) = -\operatorname{tr}(\gamma^{\mu})$  $\operatorname{tr}(\gamma^{\mu}) = 0$  $\checkmark \operatorname{tr}(\mathbf{p}) = \operatorname{tr}(p_{\mu}\gamma^{\mu}) = p_{\mu}\operatorname{tr}(\gamma^{\mu}) = 0$  $\mathbf{M}$  由于  $\gamma^{\mu}\gamma^{\nu} = 2a^{\mu\nu} - \gamma^{\nu}\gamma^{\mu}$ ,两个 Dirac 矩阵乘积之迹满足  $\operatorname{tr}(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}) = \operatorname{tr}(2q^{\mu\nu} - \gamma^{\nu}\gamma^{\mu}) = 2q^{\mu\nu}\operatorname{tr}(1) - \operatorname{tr}(\gamma^{\nu}\gamma^{\mu}) = 8q^{\mu\nu} - \operatorname{tr}(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu})$  $\operatorname{tr}(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}) = 4g^{\mu\nu}$  $fr(pq) = p_{\mu}q_{\nu}\operatorname{tr}(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}) = 4p_{\mu}q_{\nu}q^{\mu\nu} = 4p \cdot q$ 

<sup><sup>2</sup>阶 Feynman 图</sup>

🦙 从而将非极化不变振幅模方化为

 $\overline{|\mathcal{M}|^2} = \kappa^2 \operatorname{tr}(\not p \not q - m_\psi \not p + m_\psi \not q - m_\psi^2) = \kappa^2 [\operatorname{tr}(\not p \not q) - m_\psi^2 \operatorname{tr}(\mathbf{1})] = 4\kappa^2 (p \cdot q - m_\psi^2)$ 

## $\phi ightarrow \psi ar{\psi}$ 衰变宽度

<u><sub>\_ ん</sub>1</u> 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

ightarrow 根据质壳条件  $k^2=m_\phi^2$  、 $p^2=q^2=m_\psi^2$  和能动量守恒关系  $k^\mu=p^\mu+q^\mu$  ,有

$$m_{\phi}^{2} = k^{2} = (p+q)^{2} = p^{2} + q^{2} + 2p \cdot q = 2(m_{\psi}^{2} + p \cdot q)$$

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

$$p \cdot q = \frac{m_{\phi}^2}{2} - m_{\psi}^2, \quad p \cdot q - m_{\psi}^2 = \frac{1}{2}(m_{\phi}^2 - 4m_{\psi}^2) = \frac{m_{\phi}^2}{2}\left(1 - \frac{4m_{\psi}^2}{m_{\phi}^2}\right)$$

 $\displaystyle igodoldsymbol{\psi}$   $\psi$  与  $ar{\psi}$  是不全同的正反粒子 🥔 末态对称性因子 S=1

000000000000

m 代入  $\overline{|\mathcal{M}|^2} = 4\kappa^2(p \cdot q - m_\psi^2)$ ,  $\phi \to \psi \bar{\psi}$  衰变过程的领头阶衰变宽度为

$$\begin{split} \Gamma(\phi \to \psi \bar{\psi}) &= \frac{1}{\mathcal{S}} \frac{|\mathcal{M}|^2}{16\pi m_\phi} \sqrt{1 - \frac{4m_\psi^2}{m_\phi^2}} = \frac{\kappa^2}{4\pi m_\phi} \sqrt{1 - \frac{4m_\psi^2}{m_\phi^2}} \left( p \cdot q - m_\psi^2 \right) \\ &= \frac{\kappa^2 m_\phi}{8\pi} \left( 1 - \frac{4m_\psi^2}{m_\phi^2} \right)^{3/2} \end{split}$$

**儒** 如果  $m_\phi=2m_\psi$ ,则  $\Gamma(\phi o \psiar\psi)=0$ , $\phi o \psiar\psi$  衰变过程不能发生

余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1 节和 7.2 节

### 7.1.2 小节 κ<sup>2</sup> 阶 Feynman 图

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

举 在 iT 展开式的第 2 阶,即  $\kappa^2$  阶,有  $iT^{(2)} = \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x \, d^4y \, \mathsf{T}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] = \sum^{14} iT_j^{(2)}$ 

♪ 根据 Wick 定理,共有 14 个非平庸的项  $T_i^{(2)}$ 

蒙 首先,有1项不包含缩并,iT<sub>1</sub><sup>(2)</sup> =  $\frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x d^4y \, N[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)]$  蒙 其次,有5项包含1次缩并,

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

$$\begin{split} \mathrm{i}T_{2}^{(2)} &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}x \,\mathrm{d}^{4}y \,\mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] \\ \mathrm{i}T_{3}^{(2)} &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}x \,\mathrm{d}^{4}y \,\mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] \\ \mathrm{i}T_{4}^{(2)} &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}x \,\mathrm{d}^{4}y \,\mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\bar{\psi}(y)] \\ \mathrm{i}T_{5}^{(2)} &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}x \,\mathrm{d}^{4}y \,\mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] \\ \mathrm{i}T_{6}^{(2)} &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}x \,\mathrm{d}^{4}y \,\mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] \end{split}$$

余钊焕 (中山大学)

# 非平庸项 $T_i^{(2)}$

Yukawa 理论

🎹 再次,有 6 项包含 2 次缩并,

$$\begin{split} \mathrm{i} T_{7}^{(2)} &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] \\ \mathrm{i} T_{8}^{(2)} &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] \\ \mathrm{i} T_{9}^{(2)} &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] \\ \mathrm{i} T_{10}^{(2)} &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] \\ \mathrm{i} T_{11}^{(2)} &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] \\ \mathrm{i} T_{12}^{(2)} &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] \end{split}$$

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

## $\psi \bar{\psi} \rightarrow \psi \bar{\psi}$ 散射过程

<u><sup>成1</sup></u>阶 Feynman 图

Yukawa 理论

L 下面讨论几个与  $iT_i^{(2)}$  相关的过程 (1) 首先,考虑  $\psi\bar{\psi} \rightarrow \psi\bar{\psi}$  散射过程,初态记为  $|i\rangle = |\mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2\rangle$ ,末态记为  $\langle f | = \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' |$ , i $T_2^{(2)}$  对这个过程贡献的 T 矩阵元是  $\left\langle \mathbf{q}_{1}^{+},\lambda_{1}^{\prime};\,\mathbf{q}_{2}^{-},\lambda_{2}^{\prime}\right|\mathrm{i}T_{2}^{(2)}\left|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1};\,\mathbf{p}_{2}^{-},\lambda_{2}\right\rangle$  $= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^2}{2!} \int \mathrm{d}^4x \, \mathrm{d}^4y \, \left\langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \, \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' \right| \, \mathsf{N}[\overleftarrow{\phi(x)\psi(x)\phi(y)\phi(y)\psi(y)}] \left| \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \, \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \right\rangle$  $= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x \, d^4y \, \left\langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \, \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' \right| \mathsf{N}[-\psi_a^{(-)}(x)\bar{\psi}_a^{(-)}(x)\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_b^{(+)}(y)\psi_b^{(+)}(y) \right\rangle$  $-\psi_{L}^{(-)}(y)\bar{\psi}_{L}^{(-)}(y)\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_{a}^{(+)}(x)\psi_{a}^{(+)}(x) + \psi_{a}^{(-)}(x)\bar{\psi}_{L}^{(-)}(y)\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_{a}^{(+)}(x)\psi_{L}^{(+)}(y)$  $+\psi_{b}^{(-)}(y)\bar{\psi}_{a}^{(-)}(x)\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_{b}^{(+)}(y)\psi_{a}^{(+)}(x)]\left|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1};\,\mathbf{p}_{2}^{-},\lambda_{2}\right\rangle$ 

<sup>
<sub>κ</sub><sup>2</sup> 阶 Feynman 图
</sup>

🍉 第二步将场算符分解为正负能解,得到 4 个非零项

余钊焕(中山大学)

Yukawa 理论

$$\begin{split} & \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \, \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}' \right| \mathrm{i}T_{2}^{(2)} \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle \\ &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \, \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}' \right| \, \mathsf{N}[-\psi_{a}^{(-)}(x)\bar{\psi}_{a}^{(-)}(x)\phi(y)\phi(y)\bar{\psi}_{b}^{(+)}(y)\psi_{b}^{(+)}(y) \\ &-\psi_{b}^{(-)}(y)\bar{\psi}_{b}^{(-)}(y)\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_{a}^{(+)}(x)\psi_{a}^{(+)}(x) + \psi_{a}^{(-)}(x)\bar{\psi}_{b}^{(-)}(y)\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_{a}^{(+)}(x)\psi_{b}^{(+)}(y) \\ &+\psi_{b}^{(-)}(y)\bar{\psi}_{a}^{(-)}(x)\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_{b}^{(+)}(y)\psi_{a}^{(+)}(x)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle \\ &= -(-\mathrm{i}\kappa)^{2} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \, \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}' \right| \, \mathsf{N}[\psi_{a}^{(-)}(x)\bar{\psi}_{a}^{(-)}(x)\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_{b}^{(+)}(y)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle \\ &-\psi_{a}^{(-)}(x)\bar{\psi}_{b}^{(-)}(y)\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_{a}^{(+)}(x)\psi_{b}^{(+)}(y) \right| \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle \end{split}$$

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

与第1项相同,因而可只保留一项,再乘上2!因子,它刚好与前面1/2!因子抵消 🍋 类似地,第 3 项与第 4 项也具有这种交换 x 和 y 的对称性

Yukawa 理论

$$\begin{split} & \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \, \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}' \right| \mathrm{i}T_{2}^{(2)} \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle \\ &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \, \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}' \right| \, \mathsf{N}[-\psi_{a}^{(-)}(x)\bar{\psi}_{a}^{(-)}(x)\bar{\phi}(x)\bar{\phi}(y)\bar{\psi}_{b}^{(+)}(y)\psi_{b}^{(+)}(y) \\ &-\psi_{b}^{(-)}(y)\bar{\psi}_{b}^{(-)}(y)\bar{\phi}(x)\bar{\phi}(y)\bar{\psi}_{a}^{(+)}(x)\psi_{a}^{(+)}(x) + \psi_{a}^{(-)}(x)\bar{\psi}_{b}^{(-)}(y)\bar{\phi}(x)\bar{\phi}(y)\bar{\psi}_{a}^{(+)}(x)\psi_{b}^{(+)}(y) \\ &+\psi_{b}^{(-)}(y)\bar{\psi}_{a}^{(-)}(x)\bar{\phi}(x)\bar{\phi}(y)\bar{\psi}_{b}^{(+)}(y)\psi_{a}^{(+)}(x)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle \\ &= -(-\mathrm{i}\kappa)^{2} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \, \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}' \right| \, \mathsf{N}[\psi_{a}^{(-)}(x)\bar{\psi}_{a}^{(-)}(x)\bar{\phi}(x)\bar{\phi}(y)\bar{\psi}_{b}^{(+)}(y)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle \\ &-\psi_{a}^{(-)}(x)\bar{\psi}_{b}^{(-)}(y)\bar{\phi}(x)\bar{\phi}(y)\bar{\psi}_{a}^{(+)}(x)\psi_{b}^{(+)}(y)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle \end{split}$$

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

与第1项相同,因而可只保留一项,再乘上2!因子,它刚好与前面1/2!因子抵消 🍋 类似地, 🛱 3 项与 🛱 4 项也具有这种交换 x 和 y 的对称性

**渔** 这是个普遍规律: 
$$iT^{(n)} = \frac{(-i)^n}{n!} \int d^4x_1 \cdots d^4x_n T[\mathcal{H}_1(x_1) \cdots \mathcal{H}_1(x_n)]$$
  
中的 1/*n*! 因子总是恰好与时空坐标的交换对称性引起的 *n*! 因子抵消

余钊焕 (中山大学)

## 相对符号

 $\kappa^1$  阶 Feynman 图

Yukawa 理论

$$\begin{split} & \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \, \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}' \right| \mathrm{i}T_{2}^{(2)} \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle \\ &= -(-\mathrm{i}\kappa)^{2} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \, \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}' \right| \mathsf{N}[\psi_{a}^{(-)}(x)\bar{\psi}_{a}^{(-)}(x)\bar{\psi}_{a}^{(+)}(y)\bar{\psi}_{b}^{(+)}(y)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle \\ &= -(-\mathrm{i}\kappa)^{2} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \left\{ \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \, \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}' \right| \mathsf{N}[\psi_{a}(x)\bar{\psi}_{a}(x)\bar{\psi}_{a}(x)\bar{\psi}_{b}(y)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle \\ &- \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \, \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}' \right| \mathsf{N}[\psi_{a}(x)\bar{\psi}_{b}(y)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(y)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle \right\} \\ &= (-\mathrm{i}\kappa)^{2} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \left\{ \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \, \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}' \right| \mathsf{N}[\psi(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(y)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle \right\} \\ &+ \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \, \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}' \right| \mathsf{N}[\psi(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(y)\bar{\psi}(y)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle \right\} \end{split}$$

 第二步写成场算符与初末态缩并的形式,花括号中两项的相对符号为负
 第三步将场算符调回原来的次序,不再出现额外的负号,验证了前述 T 矩阵元的 缩并规律

余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1 节和 7.2 节

# Yukawa 理论 阶 Feynman 图 ■ Feynman 规则 $\psi\bar{\psi} \rightarrow \psi\bar{\psi}$ 散射的 Feynman 图 $\left\langle \mathbf{q}_{1}^{+},\lambda_{1}^{\prime};\,\mathbf{q}_{2}^{-},\lambda_{2}^{\prime}\right|\mathrm{i}T_{2}^{(2)}\left|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1};\,\mathbf{p}_{2}^{-},\lambda_{2}\right\rangle$ $= -(-\mathrm{i}\kappa)^2 \int \mathrm{d}^4x \, \mathrm{d}^4y \left\{ \left\langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \, \mathbf{q}_2^-, \lambda_2' \right| \mathsf{N}[\psi_a(x) \dot{\psi_a}(x) \phi(x) \phi(y) \dot{\psi_b}(y) \psi_b(y)] \, \middle| \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \, \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \right\rangle$ $-\left\langle \mathbf{\dot{q}}_{1}^{+}, \lambda_{1}^{\prime}; \mathbf{\dot{q}}_{2}^{-}, \lambda_{2}^{\prime} \middle| \mathbf{N}[\psi_{a}(x)\dot{\psi}_{b}(y)\phi(x)\phi(y)\dot{\psi}_{a}(x)\psi_{b}(y)] \middle| \mathbf{\dot{p}}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{\dot{p}}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle \right\}$ $= -(-i\kappa)^2 \int d^4x \, d^4y \Big[ v_a(\mathbf{q}_2, \lambda_2') e^{i\mathbf{q}_2 \cdot x} \bar{u}_a(\mathbf{q}_1, \lambda_1') e^{i\mathbf{q}_1 \cdot x} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{i e^{-ik \cdot (x-y)}}{k^2 - m_1^2 + i\epsilon}$ $\times \bar{v}_b(\mathbf{p}_2,\lambda_2) e^{-ip_2 \cdot y} u_b(\mathbf{p}_1,\lambda_1) e^{-ip_1 \cdot y}$ $-v_a(\mathbf{q}_2,\lambda_2')\mathrm{e}^{\mathrm{i}q_2\cdot x}\bar{u}_b(\mathbf{q}_1,\lambda_1')\mathrm{e}^{\mathrm{i}q_1\cdot y}\int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4}\frac{\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot(x-y)}}{k^2-m_{\scriptscriptstyle A}^2+\mathrm{i}\epsilon}$ $\times \bar{v}_a(\mathbf{p}_2, \lambda_2) \mathrm{e}^{-\mathrm{i} p_2 \cdot x} u_b(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \mathrm{e}^{-\mathrm{i} p_1 \cdot y} \Big|$



第7章 Feynman 图 7.1节和 7.2节

42 / 78

余钊焕(中山大学)

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

<sup>2</sup>阶 Feynman 图

动量空间 Feynman 规则 000000000

#### $\psiar{\psi} ightarrow\psiar{\psi}$ 的T矩阵元

Yukawa 理论

🍎 对 x 和 y 分别积分,得  $\left\langle \mathbf{q}_{1}^{+},\lambda_{1}^{\prime};\,\mathbf{q}_{2}^{-},\lambda_{2}^{\prime}\right|\mathrm{i}T_{2}^{(2)}\left|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1};\,\mathbf{p}_{2}^{-},\lambda_{2}\right\rangle$  $= -(-\mathrm{i}\kappa)^2 \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4} \left[ \bar{u}(\mathbf{q}_1,\lambda_1')v(\mathbf{q}_2,\lambda_2') \frac{\mathrm{i}}{k^2 - m_{\star}^2 + \mathrm{i}\epsilon} \bar{v}(\mathbf{p}_2,\lambda_2)u(\mathbf{p}_1,\lambda_1) \right]$  $\times (2\pi)^4 \delta^{(4)} (k - q_1 - q_2) (2\pi)^4 \delta^{(4)} (p_1 + p_2 - k)$ 🗭 对 x 和 y 积分使方括号中每  $-ar{v}(\mathbf{p}_2,\lambda_2)v(\mathbf{q}_2,\lambda_2')\,rac{1}{k^2-m_\phi^2+\mathrm{i}\epsilon}\,ar{u}(\mathbf{q}_1,\lambda_1')u(\mathbf{p}_1,\lambda_1)$ 一项都具有 2 个四维  $\delta$  函数, 它们分别代表 2 个顶点处的能动  $\times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k+p_2-q_2)(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1-q_1-k)$ 量守恒关系  $\bar{\psi}, \lambda_2$  $\bar{\psi}, \lambda_2' = \bar{\psi}, \lambda_2$  $\bar{\psi}, \lambda_2'$ alpha 第一项关系为  $k^{\mu} = q_1^{\mu} + q_2^{\mu}$ k $\mathbf{n} k^{\mu} = p_1^{\mu} + p_2^{\mu}$  $\bigcirc$  第二项关系为  $k^{\mu} = q_{2}^{\mu} - p_{2}^{\mu}$  $\pi h k^{\mu} = p_1^{\mu} - q_1^{\mu}$  $\psi, \lambda_1$ 

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

<sup>2</sup>阶 Feynman 图

动量空间 Feynman 规则 000000000

## $\psiar{\psi} ightarrow\psiar{\psi}$ 的T矩阵元

Yukawa 理论

🍎 对 x 和 y 分别积分,得  $\left\langle \mathbf{q}_{1}^{+},\lambda_{1}^{\prime};\,\mathbf{q}_{2}^{-},\lambda_{2}^{\prime}\right|\mathrm{i}T_{2}^{(2)}\left|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1};\,\mathbf{p}_{2}^{-},\lambda_{2}\right\rangle$  $= -(-\mathrm{i}\kappa)^2 \int \frac{\mathrm{d}^4k}{(2\pi)^4} \left[ \bar{u}(\mathbf{q}_1,\lambda_1')v(\mathbf{q}_2,\lambda_2') \frac{\mathrm{i}}{k^2 - m_{\star}^2 + \mathrm{i}\epsilon} \bar{v}(\mathbf{p}_2,\lambda_2)u(\mathbf{p}_1,\lambda_1) \right]$  $\times (2\pi)^4 \delta^{(4)} (k - q_1 - q_2) (2\pi)^4 \delta^{(4)} (p_1 + p_2 - k)$ 💭 对 x 和 y 积分使方括号中每  $-\,\bar{v}(\mathbf{p}_2,\lambda_2)v(\mathbf{q}_2,\lambda_2')\,\frac{1}{k^2-m_{\phi}^2+\mathrm{i}\epsilon}\,\bar{u}(\mathbf{q}_1,\lambda_1')u(\mathbf{p}_1,\lambda_1)$ 一项都具有 2 个四维  $\delta$  函数, 它们分别代表 2 个顶点处的能动  $\times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k+p_2-q_2)(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1-q_1-k) \Big|$ 量守恒关系  $\bar{\psi}, \lambda_2' \quad \bar{\psi}, \lambda_2 \quad p_2$  $\bar{\psi}, \lambda'_2$  $\bar{\psi}, \lambda_2$  $able a = a_1^{\mu} + a_2^{\mu}$  第一项关系为  $k^{\mu} = a_1^{\mu} + a_2^{\mu}$ k $\mathbf{n} k^{\mu} = p_1^{\mu} + p_2^{\mu}$  $\bigcirc$  第二项关系为  $k^{\mu} = q_{2}^{\mu} - p_{2}^{\mu}$  $\pi k^{\mu} = p_{1}^{\mu} - a_{1}^{\mu}$  $\psi, \lambda_1$  $\psi, \lambda'_1$ 

👗 与同一顶点相连的内外线的四维动量应满足能动量守恒定律

余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1 节和 7.2 节

43 / 78

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

<sup>2</sup>阶 Feynman 图

#### $\psiar{\psi} o \psiar{\psi}$ 不变振幅

Yukawa 理论

 ${igwedsymbol{\lambda}}$  剩下的 1 个四维  $\delta$  函数代表初末态 4 个粒子满足的能动量守恒定律

Yukawa 理论

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

阶 Feynman 图

#### $\psiar{\psi} o \psiar{\psi}$ 不变振幅

 ★ 初分, 消去 1 个四维 δ 函数, 得
 (q<sub>1</sub><sup>+</sup>, λ'<sub>1</sub>; q<sub>2</sub><sup>-</sup>, λ'<sub>2</sub> | iT<sub>2</sub><sup>(2)</sup> | p<sub>1</sub><sup>+</sup>, λ<sub>1</sub>; p<sub>2</sub><sup>-</sup>, λ<sub>2</sub> )
 = -(-i\kappa)<sup>2</sup> [ \bar{u}(q\_1, \lambda'\_1)v(q\_2, \lambda'\_2) \frac{i}{(p\_1 + p\_2)^2 - m\_{\phi}^2 + i\epsilon} \bar{v}(p\_2, \lambda\_2)u(p\_1, \lambda\_1)
 - \bar{v}(p\_2, \lambda\_2)v(q\_2, \lambda'\_2) \frac{i}{(p\_1 - q\_1)^2 - m\_{\phi}^2 + i\epsilon} \bar{u}(q\_1, \lambda'\_1)u(p\_1, \lambda\_1) ]
 ×(2\pi)<sup>4</sup> \delta<sup>(4)</sup>(p\_1 + p\_2 - q\_1 - q\_2)

 $\ragkinksinglesize{1}$  剩下的 1 个四维  $\delta$  函数代表初末态 4 个粒子满足的能动量守恒定律

$$\begin{split} \mathbf{i}\mathcal{M} &= -(-\mathbf{i}\kappa)^2 \left[ \bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda_1') v(\mathbf{q}_2, \lambda_2') \, \frac{\mathbf{i}}{(p_1 + p_2)^2 - m_{\phi}^2 + \mathbf{i}\epsilon} \, \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right. \\ &\left. - \bar{v}(\mathbf{p}_2, \lambda_2) v(\mathbf{q}_2, \lambda_2') \, \frac{\mathbf{i}}{(p_1 - q_1)^2 - m_{\phi}^2 + \mathbf{i}\epsilon} \, \bar{u}(\mathbf{q}_1, \lambda_1') u(\mathbf{p}_1, \lambda_1) \right] \end{split}$$

🎄 这个表达式不包含积分,内线动量由外线动量完全确定,这是树图的特征

#### $\psi\psi ightarrow \psi\psi$ 散射过程

<u>κ<sup>1</sup></u>阶 Feynman 图

Yukawa 理论

(2)  $iT_2^{(2)}$  也可以贡献到  $\psi \psi \rightarrow \psi \psi$  散射过程</u>,记初态为  $|i\rangle = |\mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^+, \lambda_2\rangle$ ,末 态为  $\langle f| = \langle \mathbf{q}_1^+, \lambda_1'; \mathbf{q}_2^+, \lambda_2' |$ ,相应的 *T* 矩阵元为

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

\_\_\_\_\_\_

这里出现了 🛩 两个正能解旋量场算符对全同费米子初态的作用, 以及 🛓 两个负能解旋量场算符对全同费米子末态的作用

余钊焕(中山大学)

#### 两个正能解旋量场算符对全同费米子初态的作用

关似于 5.5.4 小节计算双费米子态内积的过程,多次运用产生湮灭算符的反对易 关系,得到两个正能解旋量场算符对全同费米子初态的作用为

$$\begin{split} \psi_{a}^{(+)}(x)\psi_{b}^{(+)}(y)\left|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{+},\lambda_{2}\right\rangle \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^{3}k_{1}\,\mathrm{d}^{3}k_{2}}{(2\pi)^{6}\sqrt{4E_{\mathbf{k}_{1}}E_{\mathbf{k}_{2}}}} \sum_{\sigma_{1}\sigma_{2}}u_{a}(\mathbf{k}_{1},\sigma_{1})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_{1}\cdot x}u_{b}(\mathbf{k}_{2},\sigma_{2})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_{2}\cdot y} \\ &\times\sqrt{4E_{\mathbf{p}_{1}}E_{\mathbf{p}_{2}}}\,a_{\mathbf{k}_{1},\sigma_{1}}a_{\mathbf{k}_{2},\sigma_{2}}a_{\mathbf{p}_{1},\lambda_{1}}a_{\mathbf{p}_{2},\lambda_{2}}^{\dagger}\left|0\right\rangle \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^{3}k_{1}\,\mathrm{d}^{3}k_{2}}{(2\pi)^{6}}\sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}_{1}}E_{\mathbf{p}_{2}}}{E_{\mathbf{k}_{1}}E_{\mathbf{k}_{2}}}}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k_{1}\cdot x+k_{2}\cdot y)}\sum_{\sigma_{1}\sigma_{2}}u_{a}(\mathbf{k}_{1},\sigma_{1})u_{b}(\mathbf{k}_{2},\sigma_{2}) \\ &\times a_{\mathbf{k}_{1},\sigma_{1}}[(2\pi)^{3}\delta_{\sigma_{2}\lambda_{1}}\delta^{(3)}(\mathbf{k}_{2}-\mathbf{p}_{1})-a_{\mathbf{p}_{1},\lambda_{1}}a_{\mathbf{k}_{2},\sigma_{2}}]a_{\mathbf{p}_{2},\lambda_{2}}^{\dagger}\left|0\right\rangle \\ &= \int \frac{\mathrm{d}^{3}k_{1}\,\mathrm{d}^{3}k_{2}}{(2\pi)^{6}}\sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}_{1}}E_{\mathbf{p}_{2}}}{E_{\mathbf{k}_{1}}E_{\mathbf{k}_{2}}}}\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k_{1}\cdot x+k_{2}\cdot y)}\sum_{\sigma_{1}\sigma_{2}}u_{a}(\mathbf{k}_{1},\sigma_{1})u_{b}(\mathbf{k}_{2},\sigma_{2}) \\ &\times(2\pi)^{6}[\delta_{\sigma_{2}\lambda_{1}}\delta^{(3)}(\mathbf{k}_{2}-\mathbf{p}_{1})\delta_{\sigma_{1}\lambda_{2}}\delta^{(3)}(\mathbf{k}_{1}-\mathbf{p}_{2}) \\ &-\delta_{\sigma_{1}\lambda_{1}}\delta^{(3)}(\mathbf{k}_{1}-\mathbf{p}_{1})\delta_{\sigma_{2}\lambda_{2}}\delta^{(3)}(\mathbf{k}_{2}-\mathbf{p}_{2})]\,|0\rangle \\ &= \left[u_{a}(\mathbf{p}_{2},\lambda_{2})u_{b}(\mathbf{p}_{1},\lambda_{1})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\mathbf{p}_{2}\cdot x+p_{1}\cdot y)}-u_{a}(\mathbf{p}_{1},\lambda_{1})u_{b}(\mathbf{p}_{2},\lambda_{2})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_{1}\cdot x+p_{2}\cdot y)}\right]\,|0\rangle \end{split}$$

余钊焕(中山大学)

## 场算符与初态的两种可能缩并

<sub>形</sub>1 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

$$\begin{split} \psi_{a}^{(+)}(x)\psi_{b}^{(+)}(y)\left|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1};\,\mathbf{p}_{2}^{+},\lambda_{2}\right\rangle \\ &=\left[u_{a}(\mathbf{p}_{2},\lambda_{2})u_{b}(\mathbf{p}_{1},\lambda_{1})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_{2}\cdot x+p_{1}\cdot y)}-u_{a}(\mathbf{p}_{1},\lambda_{1})u_{b}(\mathbf{p}_{2},\lambda_{2})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p_{1}\cdot x+p_{2}\cdot y)}\right]\left|0\right\rangle \\ &=\mathsf{N}[\overbrace{\psi_{a}(x)},\overbrace{\psi_{b}(y)}]\left|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1};\,\mathbf{p}_{2}^{+},\lambda_{2}\right\rangle-\mathsf{N}[\overbrace{\psi_{b}(y)},\overbrace{\psi_{a}(x)}]\left|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1};\,\mathbf{p}_{2}^{+},\lambda_{2}\right\rangle \\ &=\mathsf{N}[\overbrace{\psi_{a}(x)},\overbrace{\psi_{b}(y)}]\left|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1};\,\mathbf{p}_{2}^{+},\lambda_{2}\right\rangle+\mathsf{N}[\overbrace{\psi_{a}(x)},\overbrace{\psi_{b}(y)}]\left|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1};\,\mathbf{p}_{2}^{+},\lambda_{2}\right\rangle \end{split}$$

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

第一、二步中第二项前面的负号体现了交换全同费米子的反对称性
 交换第二项两个场算符恢复原来的次序之后,这个负号没有出现在第三步中,此
 时表示缩并的线纠缠起来

🔀 可见,两个正能解旋量场算符对全同费米子初态的作用对应于场算符与初态的两 种可能缩并

#### 两个负能解旋量场算符对全同费米子末态的作用

📥 两个负能解旋量场算符对全同费米子末态的作用为

🋠 可见,这种作用对应于场算符与末态的两种可能缩并

余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1节和 7.2节

## 与全同费米子初末态的缩并

<u><sup><sub>ル</sub>1</sub></u>阶 Feynman 图</u></sup>

Yukawa 理论

🚄 根据上述作用结果,得到花括号中的 4 项,对应于初态和末态各自的 2 种缩并

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

$$\begin{split} & \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{+}, \lambda_{2}' \right| iT_{2}^{(2)} \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{+}, \lambda_{2} \right\rangle \\ &= -\frac{(-i\kappa)^{2}}{2!} \int d^{4}x \, d^{4}y \, \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{+}, \lambda_{2}' \right| \, \mathsf{N}[\bar{\psi}_{a}^{(-)}(x)\bar{\psi}_{b}^{(-)}(y) \\ & \times \overline{\phi(x)}\phi(y)\psi_{a}^{(+)}(x)\psi_{b}^{(+)}(y)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{+}, \lambda_{2} \right\rangle \\ &= -\frac{(-i\kappa)^{2}}{2!} \int d^{4}x \, d^{4}y \\ & \times \Big\{ \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{+}, \lambda_{2}' \right| \, \mathsf{N}[\bar{\psi}_{a}(x)\bar{\psi}_{b}(y)\phi(x)\phi(y)\psi_{a}(x)\bar{\psi}_{b}(y)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{+}, \lambda_{2} \right\rangle \\ & - \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{+}, \lambda_{2}' \right| \, \mathsf{N}[\bar{\psi}_{b}(y)\bar{\psi}_{a}(x)\phi(x)\phi(y)\psi_{b}(y)\bar{\psi}_{a}(x)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{+}, \lambda_{2} \right\rangle \\ & - \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{+}, \lambda_{2}' \right| \, \mathsf{N}[\bar{\psi}_{b}(y)\bar{\psi}_{a}(x)\phi(x)\phi(y)\psi_{b}(y)\bar{\psi}_{a}(x)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{+}, \lambda_{2} \right\rangle \\ & + \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{+}, \lambda_{2}' \right| \, \mathsf{N}[\bar{\psi}_{b}(y)\bar{\psi}_{a}(x)\phi(x)\phi(y)\psi_{b}(y)\psi_{a}(x)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{+}, \lambda_{2} \right\rangle \Big\} \end{split}$$

## 时空坐标的交换对称性

$$\begin{pmatrix} \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{+}, \lambda_{2}' | iT_{2}^{(2)} | \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{+}, \lambda_{2} \rangle \\ = -\frac{(-i\kappa)^{2}}{2!} \int d^{4}x \, d^{4}y \\ \times \left\{ \langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{+}, \lambda_{2}' | \mathbf{N}[\bar{\psi}_{a}(x)\bar{\psi}_{b}(y)\phi(x)\phi(y)\psi_{a}(x)\bar{\psi}_{b}(y)] | \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{+}, \lambda_{2} \rangle \\ - \langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{+}, \lambda_{2}' | \mathbf{N}[\bar{\psi}_{b}(y)\bar{\psi}_{a}(x)\phi(x)\phi(y)\psi_{a}(x)\bar{\psi}_{b}(y)] | \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{+}, \lambda_{2} \rangle \\ - \langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{+}, \lambda_{2}' | \mathbf{N}[\bar{\psi}_{b}(y)\bar{\psi}_{a}(x)\phi(x)\phi(y)\psi_{b}(y)\psi_{a}(x)] | \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{+}, \lambda_{2} \rangle \\ + \langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{+}, \lambda_{2}' | \mathbf{N}[\bar{\psi}_{b}(y)\bar{\psi}_{a}(x)\phi(x)\phi(y)\psi_{b}(y)\psi_{a}(x)] | \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{+}, \lambda_{2} \rangle \\ = -(-i\kappa)^{2} \int d^{4}x \, d^{4}y \\ \times \left\{ \langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{+}, \lambda_{2}' | \mathbf{N}[\bar{\psi}_{b}(y)\bar{\psi}_{a}(x)\phi(x)\phi(y)\psi_{a}(x)\psi_{b}(y)] | \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{+}, \lambda_{2} \rangle \\ - \langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{+}, \lambda_{2}' | \mathbf{N}[\bar{\psi}_{b}(y)\bar{\psi}_{a}(x)\phi(x)\phi(y)\psi_{a}(x)\psi_{b}(y)] | \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{+}, \lambda_{2} \rangle \\ - \langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{+}, \lambda_{2}' | \mathbf{N}[\bar{\psi}_{b}(y)\bar{\psi}_{a}(x)\phi(x)\phi(y)\psi_{a}(x)\psi_{b}(y)] | \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{+}, \lambda_{2} \rangle \\ \end{pmatrix} \\ \begin{cases} \mathbf{\hat{H}} - \mathbf{\hat{F}} \mathbf{\hat{H}} \mathbf{1}, \mathbf{4} \ \mathbf{\eta} \mathbf{n} \mathbf{\hat{H}} \mathbf{2} \mathbf{2} \ \mathbf{\hat{H}} \mathbf{\hat{H}} \mathbf{\hat{H}} \mathbf{E} \mathbf{\hat{H}} \mathbf{n} \mathbf{n} \mathbf{1} \mathbf{1} \mathbf{2} \mathbf{E} \mathbf{X} \end{cases}$$

第7章

## T 矩阵元的缩并规律

 $\kappa^1$  阶 Feynman 图

Yukawa 理论

$$\begin{array}{l} \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+},\lambda_{1}^{\prime};\,\mathbf{q}_{2}^{+},\lambda_{2}^{\prime}\right|\mathrm{i}T_{2}^{(2)}|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1};\,\mathbf{p}_{2}^{+},\lambda_{2}\rangle \\ = -(-\mathrm{i}\kappa)^{2}\int\mathrm{d}^{4}x\,\mathrm{d}^{4}y \\ \times \left\{ \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+},\lambda_{1}^{\prime};\,\mathbf{q}_{2}^{+},\lambda_{2}^{\prime}\right|\,\mathsf{N}[\bar{\psi}_{a}(x)\bar{\psi}_{b}(y)\bar{\phi}(x)\phi(y)\bar{\psi}_{a}(x)\bar{\psi}_{b}(y)]\,|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1};\,\mathbf{p}_{2}^{+},\lambda_{2}\rangle \\ -\left\langle \mathbf{q}_{1}^{+},\lambda_{1}^{\prime};\,\mathbf{q}_{2}^{+},\lambda_{2}^{\prime}\right|\,\mathsf{N}[\bar{\psi}_{b}(y)\bar{\psi}_{a}(x)\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}_{a}(x)\bar{\psi}_{b}(y)]\,|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1};\,\mathbf{p}_{2}^{+},\lambda_{2}\rangle \\ = (-\mathrm{i}\kappa)^{2}\int\mathrm{d}^{4}x\,\mathrm{d}^{4}y \\ \times \left\{ \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+},\lambda_{1}^{\prime};\,\mathbf{q}_{2}^{+},\lambda_{2}^{\prime}\right|\,\mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\bar{\psi}(y)]\,|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1};\,\mathbf{p}_{2}^{+},\lambda_{2}\rangle \\ +\left\langle \mathbf{q}_{1}^{+},\lambda_{1}^{\prime};\,\mathbf{q}_{2}^{+},\lambda_{2}^{\prime}\right|\,\mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\bar{\psi}(y)]\,|\mathbf{p}_{1}^{+},\lambda_{1};\,\mathbf{p}_{2}^{+},\lambda_{2}\rangle \\ \right\}$$

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

#### $\psi\psi \rightarrow \psi\psi$ 散射的 Feynman 图

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

<u><sup>\_ <sub>ん</sub>2</sub></u>阶 Feynman 图</u></sup>

Feynman 图包含 2 个子图
 第 2 个子图可通过交换第 1 个
 子图中两条费米子出射外线得到
 两个子图相对符号为负,体现
 交换末态全同费米子的反对称性



余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1节和 7.2节

52 / 78
### Feynman 图拓扑结构

Yukawa 理论

一 交换左上图中初态的两条费
米子外线,得到右下图

阶 Feynman 图

《在拓扑结构上,右下图与右 上图唯一的差别是两个顶点上的 x和 y标签位置相反,故两者具 有交换时空坐标的对称性

由于对 x 和 y 都进行了积分,
 右下图与右上图是拓扑等价的,

可通过连续变形相互转换

 ⑦ 同理,交换右上图中初态两条 费米子外线得到的左下图与左上 图是拓扑等价的



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

会 实际上,左下图和右下图对应于前文利用时空坐标的交换对称性合并掉的两项
 三、 左上图和右上图包含了 i $T_2^{(2)}$  贡献到  $\psi\psi \to \psi\psi$  散射过程的全部可能拓扑结构

<sup>2</sup> 阶 Fevnman 图

 $\psi\psi 
ightarrow \psi\psi$ 的 T 矩阵元

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

余钊焕(中山大学)

### $\psi \bar{\psi} ightarrow \phi \phi$ 湮灭过程

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

(3) 接着讨论一对正反  $\psi$  费米子湮灭 (annihilation) 成一对全同  $\phi$  玻色子的过程  $\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi\phi$ ,初末态分别为  $|i\rangle = |\mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2\rangle$ 和  $\langle f| = \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2|$ [②] "湮灭"指初态中一对正反粒子 (或全同的纯中性粒子) 通过相互作用湮灭掉了

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

 $igodiamliket{k}_{3}$  i $T_{3}^{(2)}$  和 i $T_{4}^{(2)}$  都会贡献到这个过程,且满足

$$iT_4^{(2)} = \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x \, d^4y \, \mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi_a(x)}\psi_a(x)\phi(y)\overline{\psi_b(y)}\psi_b(y)]$$
  
$$= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x \, d^4y \, \mathsf{N}[\phi(y)\overline{\psi_b(y)}\overline{\psi_b(y)}\phi(x)\overline{\psi_a(x)}\psi_a(x)]$$
  
$$= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4y \, d^4x \, \mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi_b(x)}\overline{\psi_b(x)}\phi(y)\overline{\psi_a(y)}\psi_a(y)] = iT_3^{(2)}$$

## $\kappa^1$ 阶 Feynman 图 $\psi \bar{\psi} \rightarrow \phi \phi$ 的 T 矩阵元

Yukawa 理论

◎ iT<sub>3</sub><sup>(2)</sup> 和 iT<sub>4</sub><sup>(2)</sup> 对 ψψ→ φφ 的 T 矩阵元贡献为  
⟨k<sub>1</sub>; k<sub>2</sub>| (iT<sub>3</sub><sup>(2)</sup> + iT<sub>4</sub><sup>(2)</sup>) | p<sub>1</sub><sup>+</sup>, λ<sub>1</sub>; p<sub>2</sub><sup>-</sup>, λ<sub>2</sub>⟩
$$= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle k_1; k_2| N[\phi(x)\bar{\psi}_a(x)\bar{\psi}_a(x)\phi(y)\bar{\psi}_b(y)\psi_b(y)] | p_1^+, \lambda_1; p_2^-, \lambda_2 \rangle$$

$$= (-i\kappa)^2 \int d^4x d^4y \langle k_1; k_2| N[\phi^{(-)}(x)\phi^{(-)}(y)\bar{\psi}_a(x)\bar{\psi}_b(y)\bar{\psi}_a^{(+)}(x)\psi_b^{(+)}(y)] | p_1^+, \lambda_1; p_2^-, \lambda_2 \rangle$$

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

🔮 这里出现两个负能解标量场算符对全同玻色子末态的作用,作用结果为 

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{k}_{1}; \mathbf{k}_{2} | \phi^{(-)}(x) \phi^{(-)}(y) \\ &= \int \frac{d^{3}q_{1} d^{3}q_{2}}{(2\pi)^{6} \sqrt{4E_{\mathbf{q}_{1}}E_{\mathbf{q}_{2}}}} e^{i(q_{1}\cdot x + q_{2}\cdot y)} \sqrt{4E_{\mathbf{k}_{1}}E_{\mathbf{k}_{2}}} \langle 0 | a_{\mathbf{k}_{1}}a_{\mathbf{k}_{2}}a_{\mathbf{q}_{1}}^{\dagger}a_{\mathbf{q}_{2}} \\ &= \int \frac{d^{3}q_{1} d^{3}q_{2}}{(2\pi)^{6}} \sqrt{\frac{E_{\mathbf{k}_{1}}E_{\mathbf{k}_{2}}}{E_{\mathbf{q}_{1}}E_{\mathbf{q}_{2}}}} e^{i(q_{1}\cdot x + q_{2}\cdot y)} \langle 0 | a_{\mathbf{k}_{1}}[(2\pi)^{3}\delta^{(3)}(\mathbf{k}_{2} - \mathbf{q}_{1}) + a_{\mathbf{q}_{1}}^{\dagger}a_{\mathbf{k}_{2}}]a_{\mathbf{q}_{2}}^{\dagger} \\ &= \int \frac{d^{3}q_{1} d^{3}q_{2}}{(2\pi)^{6}} \sqrt{\frac{E_{\mathbf{k}_{1}}E_{\mathbf{k}_{2}}}{E_{\mathbf{q}_{1}}E_{\mathbf{q}_{2}}}} e^{i(q_{1}\cdot x + q_{2}\cdot y)} \\ &\times \langle 0 | (2\pi)^{6}[\delta^{(3)}(\mathbf{k}_{2} - \mathbf{q}_{1})\delta^{(3)}(\mathbf{k}_{1} - \mathbf{q}_{2}) + \delta^{(3)}(\mathbf{k}_{1} - \mathbf{q}_{1})\delta^{(3)}(\mathbf{k}_{2} - \mathbf{q}_{2})] \end{aligned}$$

余钊焕 (中山大学)

## 全同正负能解场算符对全同粒子态的作用

$$\begin{array}{l} \langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \, \phi^{(-)}(x) \phi^{(-)}(y) = \langle 0 | \, [\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_2 \cdot x + k_1 \cdot y)} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_1 \cdot x + k_2 \cdot y)}] \\ = \langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \, \mathsf{N}[\phi(x)\phi(y)] + \langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \, \mathsf{N}[\phi(y)\phi(x)] = \langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \, \mathsf{N}[\phi(x)\phi(y)] + \langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \, \mathsf{N}[\phi(x)\phi(y)] \rangle \\ \end{array}$$

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

#### 슬 这对应于场算符与末态的两种可能缩并

 $\kappa^1$  阶 Feynman 图

- 🝣 第一、二步中第二项前面的正号体现了交换全同玻色子的对称性
- 🍰 第三步交换第二项两个场算符恢复原来的次序之后,此时表示缩并的线纠缠起来

Yukawa 理论

## 全同正负能解场算符对全同粒子态的作用

$$\langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \, \phi^{(-)}(x) \phi^{(-)}(y) = \langle 0 | \, [\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_2 \cdot x + k_1 \cdot y)} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_1 \cdot x + k_2 \cdot y)}]$$

$$= \langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \, \mathsf{N}[\phi(x)\phi(y)] + \langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \, \mathsf{N}[\phi(y)\phi(x)] = \langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \, \mathsf{N}[\phi(x)\phi(y)] + \langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \, \mathsf{N}[\phi(x)\phi(y)]$$

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

#### 슬 这对应于场算符与末态的两种可能缩并

阶 Feynman 图

- *之*雾 第一、二步中第二项前面的<mark>正号</mark>体现了交换全同玻色子的对称性
- 🥮 第三步交换第二项两个场算符恢复原来的次序之后,此时表示缩并的线纠缠起来

🍠 同理,两个正能解标量场算符对全同玻色子初态的作用结果为

#### 🧼 这对应于场算符与初态的两种可能缩并

Yukawa 理论

## 全同正负能解场算符对全同粒子态的作用

$$\langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \, \phi^{(-)}(x) \phi^{(-)}(y) = \langle 0 | \, [\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_2 \cdot x + k_1 \cdot y)} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_1 \cdot x + k_2 \cdot y)}]$$

$$= \langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \, \mathsf{N}[\phi(x)\phi(y)] + \langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \, \mathsf{N}[\phi(y)\phi(x)] = \langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \, \mathsf{N}[\phi(x)\phi(y)] + \langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \, \mathsf{N}[\phi(x)\phi(y)]$$

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

#### 🍰 这对应于场算符与末态的两种可能缩并

阶 Feynman 图

- 🝣 第一、二步中第二项前面的<mark>正号</mark>体现了交换全同玻色子的对称性
- 🥩 第三步交换第二项两个场算符恢复原来的次序之后,此时表示缩并的线纠缠起来

🍠 同理,两个正能解标量场算符对全同玻色子初态的作用结果为

$$\begin{split} \phi^{(+)}(x)\phi^{(+)}(y) \left|\mathbf{k}_{1}; \, \mathbf{k}_{2}\right\rangle &= [\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k_{2}\cdot x + k_{1}\cdot y)} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k_{1}\cdot x + k_{2}\cdot y)}] \left|0\right\rangle \\ &= \mathsf{N}[\phi(x)\phi(y)] \left|\mathbf{k}_{1}; \, \mathbf{k}_{2}\right\rangle + \mathsf{N}[\phi(y)\phi(x)] \left|\mathbf{k}_{1}; \, \mathbf{k}_{2}\right\rangle = \mathsf{N}[\phi(x)\phi(y)] \left|\mathbf{k}_{1}; \, \mathbf{k}_{2}\right\rangle + \mathsf{N}[\phi(x)\phi(y)] \left|\mathbf{k}_{1}; \, \mathbf{k}_{2}\right\rangle \end{split}$$

#### 🥯 这对应于场算符与初态的两种可能缩并

类似地可以证明, n 个全同正(负)能解场算符对 n 个相应全同 粒子初(末)态的作用等价于这些场算符与初(末)态的 n! 种缩并

余钊焕(中山大学)

Yukawa 理论

第7章 Feynman 图 7.1节和 7.2节

动量空间 Feynman 规则

## $\psi \bar{\psi} \rightarrow \phi \phi$ 湮灭过程的 Feynman 图

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1节和 7.2节

58 / 78

<sup>1</sup> 阶 Feynman 图  $\kappa^2$  阶 Feynman 图

动量空间 Feynman 规则
 000000000

## $\psi \bar{\psi} ightarrow \phi \phi$ 的 T 矩阵元

第 7 章 Feynman 图 7.1 节和 7.2 节

余钊焕(中山大学)

# ${ m i}T_5^{(2)}$ 和 ${ m i}T_6^{(2)}$

 $\kappa^1$  阶 Feynman 图

Yukawa 理论

(4)  $iT_5^{(2)}$  和  $iT_6^{(2)}$  也具有交换时空坐标的对称性

$$iT_5^{(2)} = \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x \, d^4y \, \mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\overline{\psi}(y)\psi(y)]$$
  
$$= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4x \, d^4y \, \mathsf{N}[\phi(y)\overline{\psi}(y)\psi(y)\phi(x)\overline{\psi}(x)\overline{\psi}(x)]$$
  
$$= \frac{(-i\kappa)^2}{2!} \int d^4y \, d^4x \, \mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\overline{\psi}(y)\overline{\psi}(y)] = iT_6^{(2)}$$

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

$$iT_5^{(2)} + iT_6^{(2)} = 2iT_5^{(2)} = (-i\kappa)^2 \int d^4x \, d^4y \, \mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi(x)\psi}(x)\phi(y)\overline{\psi}(y)\psi(y)]$$

✓ 考虑初态  $|i\rangle = |\mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \mathbf{p}_2^-, \lambda_2\rangle$  包含一对正反费米子,末态  $\langle f| = \langle \mathbf{k}_1; \mathbf{k}_2|$  包 含一对全同玻色子,则  $iT_5^{(2)} + iT_6^{(2)}$  对 *T* 矩阵元的贡献为

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 | \left( \mathrm{i}T_5^{(2)} + \mathrm{i}T_6^{(2)} \right) \left| \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \, \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \right\rangle \\ &= \left( -\mathrm{i}\kappa \right)^2 \int \mathrm{d}^4 x \, \mathrm{d}^4 y \, \left\langle \mathbf{k}_1; \, \mathbf{k}_2 \right| \, \mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\overline{\psi}(y)\psi(y)] \left| \mathbf{p}_1^+, \lambda_1; \, \mathbf{p}_2^-, \lambda_2 \right\rangle \end{aligned}$$

余钊焕(中山大学)

### 不相连的 Feynman 图

Yukawa 理论

阶 Feynman 图

$$\langle \mathbf{k}_{1}; \, \mathbf{k}_{2} | \left( \mathrm{i}T_{5}^{(2)} + \mathrm{i}T_{6}^{(2)} \right) | \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \rangle$$

$$= \left( -\mathrm{i}\kappa \right)^{2} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \langle \mathbf{k}_{1}; \, \mathbf{k}_{2} | \, \mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\overline{\psi}(y)\psi(y)] \, | \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \rangle$$

$$= \left( -\mathrm{i}\kappa \right)^{2} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \{ \langle \mathbf{k}_{1}; \, \mathbf{k}_{2} | \, \mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi}(x)\overline{\psi}(x)\phi(y)\overline{\psi}(y)\overline{\psi}(y)] \, | \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \rangle$$

$$+ \langle \mathbf{k}_{1}; \, \mathbf{k}_{2} | \, \mathsf{N}[\phi(x)\overline{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\overline{\psi}(y)\overline{\psi}(y)\overline{\psi}(y)] \, | \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \, \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \rangle \}$$

<sup>2</sup>阶 Fevnman 图

 $\checkmark \ \mbox{第二步跳过用正负能解表达的步骤,}$ 直接按照 T 矩阵元的缩并规律写下场算符与初末态的 2 种可能缩并承 相应 Feynman 图包含 2 个子图徵 每个子图都具有 2 个不相连的部 $分,这些部分是在 <math>\kappa^1$  阶讨论过的,它们之间不会相互影响 핱 由于末态中有一个  $\phi$  粒子没有跟其它粒子连接起来,这种图**既不满足**能动量守恒 定律,**也不会贡献**到  $\psi\bar{\psi} \rightarrow \phi\phi$ 散射过程

余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1 节和 7.2 节

# ${ m i}T_7^{(2)}$ 和 ${ m i}T_8^{(2)}$

 $\kappa^1$  阶 Feynman 图

Yukawa 理论

(5)  $iT_7^{(2)}$  和  $iT_8^{(2)}$  具有交换时空坐标的对称性

$$\begin{split} \mathrm{i}T_{7}^{(2)} &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \mathsf{N}[\overleftarrow{\phi(x)}\overline{\psi(x)}\psi(x)\phi(y)\overline{\psi(y)}\psi(y)} \\ &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \mathsf{N}[\overleftarrow{\phi(y)}\overline{\psi(y)}\psi(y)\phi(x)\overline{\psi(x)}\psi(x)} \\ &= \frac{(-\mathrm{i}\kappa)^{2}}{2!} \int \mathrm{d}^{4}y \, \mathrm{d}^{4}x \, \mathsf{N}[\overleftarrow{\phi(x)}\overline{\psi(x)}\psi(x)\phi(y)\overline{\psi(y)}\psi(y)] = \mathrm{i}T_{8}^{(2)} \\ &\mathrm{i}T_{7}^{(2)} + \mathrm{i}T_{8}^{(2)} = 2\mathrm{i}T_{7}^{(2)} = (-\mathrm{i}\kappa)^{2} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \mathsf{N}[\overleftarrow{\phi(x)}\overline{\psi(x)}\overline{\psi(x)}\overline{\psi(x)}\overline{\psi(y)}\psi(y)\psi(y)] \end{split}$$

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

\_\_\_\_\_

$$\begin{split} & \left\langle \mathbf{p}^{+}, \lambda \right| \left( \mathrm{i}T_{7}^{(2)} + \mathrm{i}T_{8}^{(2)} \right) \left| \mathbf{p}^{+}, \lambda \right\rangle \\ &= \left( -\mathrm{i}\kappa \right)^{2} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \left\langle \mathbf{p}^{+}, \lambda \right| \, \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] \left| \mathbf{p}^{+}, \lambda \right\rangle \end{split}$$

余钊焕(中山大学)



$$\begin{split} \left\langle \mathbf{p}^{+}, \lambda \right| \left( \mathrm{i}T_{7}^{(2)} + \mathrm{i}T_{8}^{(2)} \right) \left| \mathbf{p}^{+}, \lambda \right\rangle \\ &= \left( -\mathrm{i}\kappa \right)^{2} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \left\langle \mathbf{p}^{+}, \lambda \right| \, \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\bar{\psi}(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] \left| \mathbf{p}^{+}, \lambda \right\rangle \\ &= \left( -\mathrm{i}\kappa \right)^{2} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \left\langle \mathbf{p}^{+}, \lambda \right| \, \mathsf{N}[\bar{\psi}(x)\phi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\bar{\psi}(y)\bar{\psi}(y)] \left| \mathbf{p}^{+}, \lambda \right\rangle \\ &= \left( -\mathrm{i}\kappa \right)^{2} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \left\langle \mathbf{p}^{+}, \lambda \right| \, \mathsf{N}[\bar{\psi}(x)\phi(x)\phi(y)\psi(x)\bar{\psi}(y)\psi(y)] \left| \mathbf{p}^{+}, \lambda \right\rangle \\ &= \left( -\mathrm{i}\kappa \right)^{2} \int \mathrm{d}^{4}x \, \mathrm{d}^{4}y \, \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) \mathrm{e}^{\mathrm{i}p \cdot x} \int \frac{\mathrm{d}^{4}k}{(2\pi)^{4}} \frac{\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k \cdot (x-y)}}{k^{2} - m_{\phi}^{2} + \mathrm{i}\epsilon} \\ &\times \int \frac{\mathrm{d}^{4}q}{(2\pi)^{4}} \frac{\mathrm{i}(\not{q} + m_{\psi})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q \cdot (x-y)}}{q^{2} - m_{\psi}^{2} + \mathrm{i}\epsilon} \, u(\mathbf{p}, \lambda) \mathrm{e}^{-\mathrm{i}p \cdot y} \end{split}$$

 
 相应的 Feynman 图是一个圈图

 这种初末态都是同一个粒子的圈图称为 该粒子的自能图 (self-energy diagram)



余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1

n图 7.1 节和 7.2 节

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图 

# ${ m i}T_7^{(2)}+{ m i}T_8^{(2)}$ 贡献的 $\psi$ 粒子单圈自能图

Feynman 图

第7章

64 / 78

 $\mathrm{i}T_7^{(2)} + \mathrm{i}T_8^{(2)}$  贡献的  $\psi$  粒子单圈自能图

$$\begin{split} &\langle \mathbf{p}^{+}, \lambda | \left( \mathrm{i} T_{7}^{(2)} + \mathrm{i} T_{8}^{(2)} \right) | \mathbf{p}^{+}, \lambda \rangle \\ &= (-\mathrm{i} \kappa)^{2} \int \mathrm{d}^{4} x \, \mathrm{d}^{4} y \, \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) \mathrm{e}^{\mathrm{i} p \cdot x} \int \frac{\mathrm{d}^{4} k}{(2\pi)^{4}} \frac{\mathrm{i} \mathrm{e}^{-\mathrm{i} k \cdot (x-y)}}{k^{2} - m_{\phi}^{2} + \mathrm{i} \epsilon} \\ &\times \int \frac{\mathrm{d}^{4} q}{(2\pi)^{4}} \frac{\mathrm{i} (q + m_{\psi}) \mathrm{e}^{-\mathrm{i} q \cdot (x-y)}}{q^{2} - m_{\psi}^{2} + \mathrm{i} \epsilon} \, u(\mathbf{p}, \lambda) \mathrm{e}^{-\mathrm{i} p \cdot y} \\ &= (-\mathrm{i} \kappa)^{2} \int \frac{\mathrm{d}^{4} k \, \mathrm{d}^{4} q}{(2\pi)^{8}} \, \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) \frac{\mathrm{i}}{k^{2} - m_{\phi}^{2} + \mathrm{i} \epsilon} \frac{\mathrm{i} (q + m_{\psi})}{q^{2} - m_{\psi}^{2} + \mathrm{i} \epsilon} \, u(\mathbf{p}, \lambda) \\ &\times (2\pi)^{4} \delta^{(4)}(q + k - p)(2\pi)^{4} \delta^{(4)}(p - q - k) \\ &= (-\mathrm{i} \kappa)^{2} \int \frac{\mathrm{d}^{4} q}{(2\pi)^{4}} \, \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) \frac{\mathrm{i}}{(p - q)^{2} - m_{\phi}^{2} + \mathrm{i} \epsilon} \frac{\mathrm{i} (q + m_{\psi})}{q^{2} - m_{\psi}^{2} + \mathrm{i} \epsilon} \, u(\mathbf{p}, \lambda) (2\pi)^{4} \delta^{(4)}(0) \\ &\rightleftharpoons (3\pi)^{4} \delta^{(4)}(q + k - p)(2\pi)^{4} \delta^{(4)}(p - q - k) \\ &= (-\mathrm{i} \kappa)^{2} \int \frac{\mathrm{d}^{4} q}{(2\pi)^{4}} \, \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) \frac{\mathrm{i}}{(p - q)^{2} - m_{\phi}^{2} + \mathrm{i} \epsilon} \frac{\mathrm{i} (q + m_{\psi})}{q^{2} - m_{\psi}^{2} + \mathrm{i} \epsilon} \, u(\mathbf{p}, \lambda) (2\pi)^{4} \delta^{(4)}(0) \\ &\clubsuit (3\pi)^{4} \delta^{(4)}(q + k - p)(2\pi)^{4} \delta^{(4)}(p - q - k) \\ &\coloneqq (3\pi)^{4} \delta^{(4)}(q + k - p)(2\pi)^{4} \delta^{(4)}(p - q - k) \\ &= (-\mathrm{i} \kappa)^{2} \int \frac{\mathrm{d}^{4} q}{(2\pi)^{4}} \, \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) \, \frac{\mathrm{i}}{(p - q)^{2} - m_{\psi}^{2} + \mathrm{i} \epsilon} \, u(\mathbf{p}, \lambda) (2\pi)^{4} \delta^{(4)}(0) \\ &\swarrow (3\pi)^{4} \delta^{(4)}(q + k - p)(2\pi)^{4} \delta^{(4)}(0) = \delta^{(4)}(p - p) \, \Phi \mathcal{W} \mathcal{W} \mathcal{H} \lambda^{(4)}(0) \\ &\swarrow (3\pi)^{4} \delta^{(4)}(q + k - p)(2\pi)^{4} \delta^{(4)}(0) = \delta^{(4)}(p - p) \, \Phi \mathcal{W} \mathcal{W} \mathcal{H} \lambda^{(4)}(0) \\ &\swarrow (3\pi)^{4} \delta^{(4)}(q + k - p)(2\pi)^{4} \delta^{(4)}(0) = \delta^{(4)}(p - p) \, \Phi \mathcal{W} \mathcal{W} \mathcal{H} \lambda^{(4)}(0) \\ &\swarrow (3\pi)^{4} \delta^{(4)}(q + k - p)(2\pi)^{4} \delta^{(4)}(0) = \delta^{(4)}(p - p) \, \Phi \mathcal{W} \mathcal{W} \mathcal{H} \lambda^{(4)}(q) \\ &\swarrow (3\pi)^{4} \delta^{(4)}(q + k - p)(2\pi)^{4} \delta^{(4)}(0) = \delta^{(4)}(p - p) \, \Phi \mathcal{W} \mathcal{W} \mathcal{H} \lambda^{(4)}(q) \\ &\swarrow (3\pi)^{4} \delta^{(4)}(q + k - p)(2\pi)^{4} \delta^{(4)}(0) = \delta^{(4)}(p - p) \, \Phi \mathcal{W} \mathcal{H} \lambda^{(4)}(q) \\ &\swarrow (3\pi)^{4} \delta^{(4)}(q + k - p)(2\pi)^{4} \delta^{(4)}(q) \\ &\downarrow (3\pi)^{4} \delta^{(4)}(q + k - p)(2\pi)^{4} \delta^{(4)}(q) \\ &\downarrow (3\pi)^{4} \delta^{(4)}(q + k - p)(2\pi)^{4} \delta^{(4)}(q) \\ &\downarrow ($$

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图

n图 7.1 节和 7.2 节

64 / 78

# ${ m i}T_9^{(2)}$ 和 ${ m i}T_{10}^{(2)}$ 贡献的 $\psi$ 粒子单圈自能图

(6)  $iT_{9}^{(2)}$  和  $iT_{10}^{(2)}$  具有交换时空坐标的对称性

Yukawa 理论

=

=

**另(** 早

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

#### $iT_{11}^{(2)}$ 贡献的 T 矩阵元

Yukawa 理论

۲

(7) 考虑初态和末态均是一个动量为 k 的  $\phi$  粒子,即  $|i\rangle = |k\rangle$ ,  $\langle f| = \langle k|$ ,则  $iT_{11}^{(2)}$ 对 T 矩阵元的贡献为

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

余钊焕 (中山大学)

7.1 节和 7.2 节 第7章 Feynman 图

## $iT_{11}^{(2)}$ 贡献的 $\phi$ 粒子单圈自能图

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

$$\begin{split} \langle \mathbf{k} | i T_{11}^{(2)} | \mathbf{k} \rangle &= -(-i\kappa)^2 \int d^4 x \, d^4 y \, \langle \mathbf{k} | \, \mathbf{N}[\phi(x)\psi_b(y)\bar{\psi}_a(x)\bar{\psi}_a(x)\bar{\psi}_b(y)\bar{\phi}(y)] \, | \mathbf{k} \rangle \\ &= -(-i\kappa)^2 \int d^4 x \, d^4 y \, \mathrm{e}^{\mathbf{i} k \cdot x} S_{\mathrm{F},ba}(y-x) S_{\mathrm{F},ab}(x-y) \mathrm{e}^{-\mathbf{i} k \cdot y} \qquad p \\ &= -(-i\kappa)^2 \int d^4 x \, d^4 y \, \mathrm{e}^{\mathbf{i} k \cdot x} \int \frac{d^4 p \, d^4 q}{(2\pi)^8} \phi - \frac{k}{(2\pi)^8} \phi + \frac{k}{(2\pi)^8} \phi \\ &\times \mathrm{tr} \left[ \frac{\mathrm{i}(\not{p} + m_\psi) \mathrm{e}^{-\mathrm{i} p \cdot (y-x)}}{p^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i} \epsilon} \frac{\mathrm{i}(\not{q} + m_\psi) \mathrm{e}^{-\mathrm{i} q \cdot (x-y)}}{q^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i} \epsilon} \right] \mathrm{e}^{-\mathrm{i} k \cdot y} q \\ &= -(-\mathrm{i} \kappa)^2 \int \frac{d^4 p \, \mathrm{d}^4 q}{(2\pi)^8} \, \mathrm{tr} \left[ \frac{\mathrm{i}(\not{p} + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i} \epsilon} \frac{\mathrm{i}(\not{q} + m_\psi)}{q^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i} \epsilon} \right] \\ &\times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(q-p-k)(2\pi)^4 \delta^{(4)}(k+p-q) \\ &= -(-\mathrm{i} \kappa)^2 \int \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4} \, \mathrm{tr} \left[ \frac{\mathrm{i}(\not{p} + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i} \epsilon} \frac{\mathrm{i}(\not{k} + \not{p} + m_\psi)}{(k+p)^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i} \epsilon} \right] (2\pi)^4 \delta^{(4)}(0) \end{split}$$

 $\kappa^2$  阶 Feynman 图

💮 相应的 Feynman 图是  $\phi$  粒子的单圈自能图

余钊焕(中山大学)

#### $^1$ 阶 Feynman 图

#### 封闭的费米子圈

Yukawa 理论

() 相应不变振幅为 
$$i\mathcal{M} = -(-i\kappa)^2 \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \operatorname{tr} \left[ \frac{\mathrm{i}(\not\!p + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i}\epsilon} \frac{\mathrm{i}(\not\!k + \not\!p + m_\psi)}{(k+p)^2 - m_\psi^2 + \mathrm{i}\epsilon} \right]$$

🤝 类似于前面的蝌蚪图,这里验证了一个**普遍**的结论:

💐 一个封闭的费米子圈贡献一个额外的<mark>负号,</mark> 并且需要对 Dirac 矩阵的乘积求迹

🐋 这样的负号是重要的,有可能影响观测量





### 封闭的费米子圈

Yukawa 理论

(1) 相应不变振幅为 
$$i\mathcal{M} = -(-i\kappa)^2 \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} tr \left| \frac{i(\not p + m_\psi)}{p^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} \frac{i(\not k + \not p + m_\psi)}{(k+p)^2 - m_\psi^2 + i\epsilon} \right|$$

<sup>2</sup> 阶 Feynman 图

🤝 类似于前面的蝌蚪图,这里验证了一个**普遍**的结论:

🔌 一个封闭的费米子圈贡献一个额外的负号, 并且需要对 Dirac 矩阵的乘积求迹



0000

动量空间 Feynman 规则

#### 🐋 这样的<mark>负号</mark>是**重要**的,有可能影响观测量

 $\sqrt[\infty]{}$  一个封闭的费米子圈上的 n 个顶点对应着 n 条费米子内线,求迹是对 n 个传播 子乘积进行的;我们已经验证了 n = 1, 2 的情形,当 n = 3 时,场算符缩并结构为

 $\mathsf{N}[\overset{!}{\bar{\psi}_{a}}(x)\overset{!}{\bar{\psi}_{b}}(x)\overset{!}{\bar{\psi}_{b}}(y)\overset{!}{\bar{\psi}_{b}}(z)\overset{!}{\bar{\psi}_{c}}(z)] = -\,\mathsf{N}[\overset{!}{\bar{\psi}_{c}}(z)\overset{!}{\bar{\psi}_{a}}(x)\overset{!}{\bar{\psi}_{b}}(y)\overset{!}{\bar{\psi}_{b}}(y)\overset{!}{\bar{\psi}_{b}}(z)]$ 

$$= -S_{F,ca}(z-x)S_{F,ab}(x-y)S_{F,bc}(y-z) = -\operatorname{tr}[S_F(z-x)S_F(x-y)S_F(y-z)]$$

*一*确实出现了<mark>负号</mark>和求迹

🐳 这个结论显然可以推广到任意 n 的情形



 $\kappa^1$  阶 Feynman 图

Yukawa 理论

eal 由于缺乏需要与初末态缩并的场算符,i $T^{(2)}_{13}$  和 i $T^{(2)}_{14}$  可贡献到任意 T 矩阵元中

👖 不过,这些气泡图只会产生一些相位因子,**没有**可观测的物理效应

余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1节和 7.2节

### 7.2 节 动量空间 Feynman 规则

<sub>形</sub>1 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

- ightarrow 在上一节中,我们利用 Wick 定理计算 T 矩阵元  $\langle f | iT | i \rangle$
- 📷 将计算过程中的各个部分表达成图形,画出 Feynman 图
- 🎇 从中归纳出一套位置空间中的 Feynman 规则
- <del>一</del> 理解这些规律之后,反过来,可以对各个过程画出<mark>所有拓扑不等价</mark>的 Feynman

 $^2$  阶 Feynman 图

- 图,然后通过 Feynman 规则写出相应 T 矩阵元  $\langle f | iT | i \rangle$  的代数表达式
- 不过,当同一过程存在多个子图且涉及费米子场算符时,需要回到带着缩并的表达式,将纠缠的缩并线解开,以确定各个子图之间的相对符号

### 7.2 节 动量空间 Feynman 规则

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

- ${\ }$   ${\ }$  在上一节中,我们利用 Wick 定理计算 T 矩阵元  $\langle f | \, iT \, | i 
  angle$
- 📷 将计算过程中的各个部分表达成图形,画出 Feynman 图
- 🎇 从中归纳出一套位置空间中的 Feynman 规则
- 理解这些规律之后,反过来,可以对各个过程画出所有拓扑不等价的 Feynman

<sup>6</sup> 阶 Feynman 图

- 图,然后通过 Feynman 规则写出相应 T 矩阵元  $\langle f | iT | i \rangle$  的代数表达式
- 不过,当同一过程存在多个子图且涉及费米子场算符时,需要回到带着缩并的表达式,将纠缠的缩并线解开,以确定各个子图之间的相对符号
- 22 在位置空间 Feynman 规则中,每个顶点对应于一个时空积分,积分的结果是使得出入顶点的内外线上的四维动量满足能动量守恒关系
- $holdsymbol{P}$ 最后得到依赖于外线动量、但不依赖于时空坐标的结果,而 T矩阵元  $\langle f | iT | i \rangle$ 分解为不变振幅 i $\mathcal{M}$ 与表示能动量守恒定律的因子  $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i p_f)$ 之积

利用这个规律,将 Feynman 规则改成不依赖于时空坐标的形式,称为动量空间中的 Feynman 规则,然后从 Feynman 图直接给出不变振幅 i<sub>M</sub> 的代数表达式

## 动量空间中的 Feynman 规则

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

🏮 根据上一节体现的规律,Yukawa 理论在动量空间中的 <mark>Feynman 规则</mark>如下 ① Dirac 正费米子入射外线:  $\psi, \lambda \longrightarrow = u(\mathbf{p}, \lambda)$ ② Dirac 反费米子入射外线:  $\bar{\psi}, \lambda \longrightarrow = \bar{v}(\mathbf{p}, \lambda)$ ③ Dirac 正费米子出射外线:  $\bullet$   $\psi, \lambda = \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda)$ ④ Dirac 反费米子出射外线:  $\stackrel{p}{\longleftarrow}$   $\bar{\psi}, \lambda = v(\mathbf{p}, \lambda)$ ● Dirac 费米子传播子: ●  $p = \frac{i(p + m_{\psi})}{p^2 - m_{\psi}^2 + i\epsilon} = \frac{i}{p - m_{\psi} + i\epsilon}$ **6** 实标量玻色子入射外线:  $\phi - - - - - = 1$ 实标量玻色子出射外线:  $\bullet - - - - - \phi = 1$ 

阶 Feynman 图

动量空间 Feynman 规则

00000000

动量空间 Feynman 规则 ○○●○○○○○

## 动量空间中的 Feynman 规则

Yukawa 理论



🔟 出入每个顶点的内外线四维动量满足能动量守恒关系

- **①** 每个未定的圈动量  $p^{\mu}$  贡献一个积分  $\int \frac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4}$
- 😰 每个封闭的费米子圈贡献一个额外的负号,并需要对费米子传播子的乘积求迹

## 动量空间中的 Feynman 规则

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论



- 🔟 出入每个顶点的内外线四维动量满足能动量守恒关系
- $III 每个未定的圈动量 <math>p^{\mu}$  贡献一个积分  $\int rac{\mathrm{d}^4 p}{(2\pi)^4}$
- 😰 每个封闭的费米子圈贡献一个额外的负号,并需要对费米子传播子的乘积求迹

除了顶点规则具有 Yukawa 相互作用特有的形式之外,其它规则具有一般性
 注意:顶点规则与拉氏量中的相互作用项直接对应:剥离 Yukawa 相互作用项
 *L<sub>Y</sub>* = -κ φψψ 中的场算符 φ、ψ 和 ψ,再乘以 i,就得到顶点规则的表达式 -iκ
 φ 场对应于顶点上的虚线头,ψ(ψ)场对应于指向顶点(背向顶点)的实线头

#### 动量空间 Feynman 规则的应用

 ☆ 对于某个具有确定初末态的物理过程,先画出微扰论某一阶上所有拓扑不等价的 Feynman 图,再应用动量空间 Feynman 规则,逆着费米子线上箭头方向组合出不变 振幅 iℳ 的代数表达式

🦄 下面举一些上一节中已经出现过的例子予以比较



 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

 财于某个具有确定初末态的物理过程,先画出微扰论某一阶上所有拓扑不等价的 Feynman 图,再应用动量空间 Feynman 规则,逆着费米子线上箭头方向组合出不变 振幅 i ℳ 的代数表达式

阶 Feynman 图

🦄 下面举一些上一节中已经出现过的例子予以比较

(1)  $\phi \rightarrow \psi \bar{\psi}$  衰变过程的领头阶不变振幅为



😺 在不会引起混淆的情况下,可以省略 Feynman 图顶点上的圆点

这个结果与前面的结果整体相差一个负号,这是因为此处没有调换旋量场算符的 位置以符合末态中湮灭算符的次序

🐼 不过,这个过程只有一个 Feynman 图,没有干涉效应,额外负号不影响衰变宽度

🌃 像这样的整体符号差异无关紧要,它不会改变振幅模方,因而不会影响观测量

余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1 节和 7.2 节

动量空间 Feynman 规则

000000000

## $\psi \bar{\psi} ightarrow \psi \bar{\psi}$ 散射过程

Yukawa 理论

阶 Feynman 图

(2) 在领头阶, $\psi\bar{\psi} \rightarrow \psi\bar{\psi}$  散射过程具有 2 个拓扑不等价的 Feynman 图,它们之间 的相对符号至关重要,不变振幅为

阶 Feynman 图



 olimits
 olimit

## 从缩并表达式考察相对符号

阶 Feynman 图

Yukawa 理论

🐱 先保持场算符位置写出 2 种拓扑不等价的缩并方式,再调换场算符将缩并线解开

阶 Feynman 图

$$\left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}' \right| \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle$$

$$+ \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}^{\prime}; \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}^{\prime} \right| \mathsf{N}[\phi(x)\bar{\psi}(x)\psi(x)\phi(y)\bar{\psi}(y)\psi(y)] \left| \mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \right\rangle$$

$$= - \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}' \right| \mathbf{N}[\psi_{a}(x) \psi_{a}(x) \phi(x) \phi(y) \psi_{b}(y)] |\mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \rangle \\ + \left\langle \mathbf{q}_{1}^{+}, \lambda_{1}'; \mathbf{q}_{2}^{-}, \lambda_{2}' \right| \mathbf{N}[\psi_{a}(x) \psi_{b}(y) \phi(x) \phi(y) \psi_{a}(x) \psi_{b}(y)] |\mathbf{p}_{1}^{+}, \lambda_{1}; \mathbf{p}_{2}^{-}, \lambda_{2} \rangle$$



余钊焕(中山大学)

第7章 Feynman 图 7.1节和 7.2节

75 / 78

### $\psi\psi ightarrow \psi\psi$ 散射过程

阶 Feynman 图

Yukawa 理论

(3)  $\psi\psi \rightarrow \psi\psi$  散射过程在领头阶具有 2 个拓扑不等价的 Feynman 图,不变振幅为

阶 Fevnman 图



这里画出拓扑不等价 Feynman 图的关键在于注意外线与顶点连接情况的不同
 ①
 在第一个子图中, p1 外线与 q1 外线交于同一顶点

- ${oldsymbol{*}}$  在第二个子图中, $p_1$  外线则与  $q_2$  外线交于同一顶点
- 🜒 此过程具有交换末态全同费米子的反对称性,因而两个子图的<mark>相对符号为负</mark>

## $\psi \bar{\psi} ightarrow \phi \phi$ 湮灭过程

 $\kappa^1$ 阶 Feynman 图

Yukawa 理论

(4) 在领头阶, $\psi \bar{\psi} 
ightarrow \phi \phi$  湮灭过程具有 2 个拓扑不等价的 Feynman 图,不变振幅为

阶 Feynman 图



**矇** 两个子图的费米子线结构相同,不存在相对符号差异 铔 两个子图的<mark>相对符号为正</mark>,体现交换末态全同玻色子的对称性

### $\psi$ 和 $\phi$ 粒子的单圈自能图

 $\kappa^1$  阶 Feynman 图

Yukawa 理论

(5) 对于  $iT_7^{(2)} + iT_8^{(2)}$  贡献的  $\psi$  粒子单圈自能图,不变振幅为

$$\mathbf{i}\mathcal{M} = \underbrace{\psi, \lambda}_{p} \underbrace{\frac{p-q}{p}}_{q} \psi, \lambda$$
$$= (-\mathbf{i}\kappa)^{2} \int \frac{\mathrm{d}^{4}q}{(2\pi)^{4}} \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) \frac{\mathbf{i}(\mathbf{p}+m_{\psi})}{q^{2}-m_{\psi}^{2}+\mathbf{i}\epsilon} u(\mathbf{p}, \lambda) \frac{\mathbf{i}}{(p-q)^{2}-m_{\phi}^{2}+\mathbf{i}\epsilon}$$

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

动量空间 Feynman 规则 00000000●

#### $\psi$ 和 $\phi$ 粒子的单圈自能图

Yukawa 理论

(5) 对于  $iT_7^{(2)} + iT_8^{(2)}$  贡献的  $\psi$  粒子单圈自能图,不变振幅为

$$i\mathcal{M} = \underbrace{\psi, \lambda}_{p} \underbrace{\frac{p-q}{q}}_{p} \psi, \lambda$$
$$= (-i\kappa)^{2} \int \frac{d^{4}q}{(2\pi)^{4}} \bar{u}(\mathbf{p}, \lambda) \frac{i(\mathbf{p} + m_{\psi})}{q^{2} - m_{\psi}^{2} + i\epsilon} u(\mathbf{p}, \lambda) \frac{i}{(p-q)^{2} - m_{\phi}^{2} + i\epsilon}$$

 $\kappa^2$ 阶 Feynman 图

(6)  $\phi$  粒子单圈自能图的不变振幅为

$$i\mathcal{M} = \phi - \frac{k}{(-i\kappa)^2} - \frac{k}{(2\pi)^4} \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} tr \left[ \frac{i(\not{k} + \not{p} + m_{\psi})}{(k+p)^2 - m_{\psi}^2 + i\epsilon} \frac{i(\not{p} + m_{\psi})}{p^2 - m_{\psi}^2 + i\epsilon} \right]$$

🐼 这个自能图包含一个封闭的费米子圈,上式出现了<mark>负号</mark>和求迹

 $\boldsymbol{n}$ 

余钊焕(中山大学)

动量空间 Feynman 规则 00000000●